

Aus der orthopädischen Universitätsklinik München
(Leiter: Professor Dr. Bragard)

Ueber Röntgenbefunde bei 22 Fällen von Spondylolisthesis

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde in der gesamten Medizin verfaßt
und einer Hohen Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-
Universität zu München

vorgelegt von

Johann Schöberl aus Passau

München 1936

Buchdruckerei A.-G. Passavia

Meinen lb. Eltern aus Dankbarkeit!

Wirbelverschiebungen beobachten wir nicht selten als Nebenerscheinung bei verschiedenen Erkrankungen der Wirbelfäule. Schon geringe Verlagerungen eines Wirbelkörperblockes nach der Seite, oder in der Sagittalen geben bei entsprechender Aufnahme recht eindrucksvolle Befunde. Während an der normalen Wirbelfäule Wirbel auf Wirbel sich ohne Unterbrechung der durch ihre Querschnittsmittelpunkte zu ziehenden Achse zu einer im Frontalbild geraden, im seitlichen Bild bogigen Säuler aufbaut, findet durch die Dislokation eines Wirbels oder Wirbelfäulenabschnittes eine horizontale Verschiebung jener Achse gegen die des an normaler Stelle verbliebenen Teiles statt. Vor allem aber wird dies deutlich durch die stufenförmige Unterbrechung in der einheitlichen, sich nach oben verjüngenden Kontur des Wirbelkörperstammes. Wie schon angedeutet, handelt es sich meistens nicht um die Verschiebung eines einzelnen Wirbels, sondern es beteiligt sich an der Lageveränderung häufig der gesamte auf dem verlagerten Wirbel sich aufbauende Abschnitt.

Mit dieser einzigen, den Beobachter sofort beeindruckenden Feststellung einer Wirbelverschiebung ist die Art der urfächlichen Erkrankung noch nicht geklärt. Wenn wir absehen von Luxationen und Luxationsfrakturen, die durch Einwirkung roher Gewalt auf die Wirbelfäule plötzlich schwerste Schädigungen im Aufbau dieses Organs setzen, die sich durch akute klinische Symptome kundgeben, so finden wir auch Wirbelverschiebungen auf anderem Boden, sei es als Ausdruck einer Allgemeinerkrankung, die am Knochenstützapparat einen besonderen Angriffspunkt findet, oder als ein primär degeneratives Leiden der Wirbelfäule.

Es ist allgemein bekannt, daß die Tuberkulose durch zerstörende Abbauvorgänge an den Wirbelkörpern sowohl, wie an den Bandscheiben und Quer gelenken ganze Teile zur Einschmelzung bringt, die der Körper durch später verkalkendes Entzündungsgewebe zu ersetzen versucht. Hand in Hand mit der verkäsenden Entzündung geht aber auch eine Lockerung und Vernichtung jener festigenden Elemente, die die Form und Funktion der Wirbelfäule gewährleisten. So ist es erklärlich, daß nach der Lösung der Gelenk- und Bandverbindungen der betroffene Wirbel unter der Druckwirkung des belastenden oberen Wirbelabschnittes seinen Halt auf der Unterlage verliert und eine Verschiebung erleidet.

Ebenso eindrucksvolle Bilder von Wirbelverschiebung werden bei der tabischen Arthropathie beobachtet. Im Gegensatz zur tuberkulösen Spondylitis überwiegen hier die proliferativen Vorgänge und es zeigt sich nie eine so ausgesprochene Atrophie, wie sie für die Knochentuberkulose charakteristisch ist. Die Verschiebung bei der tabischen Arthropathie erklärt sich ebenfalls durch resorptive Vorgänge in der Bandscheibe und Lösung der gelenkigen Sicherungen. In gleicher Weise sind Wirbelverschiebungen, die auf dem Boden anderer neuropathischer Arthropathien, wie der Poliomyelitis und der Syringomyelie entstanden sind, zu werten, wenn auch letztlich die Ursache des krankhaften Geschehens nicht bekannt ist, die Veranlassung zu einer so weitgehenden, langsam fortschreitenden Um-

bildung gibt und schließlich in einem groben Mißverhältnis zwischen hochgradiger Destruktion und dem Fehlen allgemeiner Knochenresorption den charakteristischen Ausdruck findet.

Mitunter führen auch metastatische Tumoren an der Wirbelsäule als Folge des brüchigen und hinfalligen Gewebes, das dem Belastungsdruck nicht mehr gewachsen ist, zur Wirbelverchiebung.

Als eine Organerkrankung der Wirbelsäule gilt die Spondylofisis und Spondylarthrosis deformans. Durch Abbau vor allem der knorpeligen Anteile an den kleinen Gelenken, aber auch an den Bandscheiben entstehen ebenfalls Verwerfungen, die allerdings selten erhebliche Grade erreichen.

Diese Formen von Wirbelverchiebungen mit Ausnahme der akuten traumatischen Luxation und Luxationsfraktur sind stets nur als ein Symptom einer übergeordneten Erkrankung zu werten, die häufig durch grobe Zerstörung von Wirbelelementen mit wenig Gefetzmäßigkeit die Verbindungen lockert und so das Gleiten verursacht. Die Grundkrankheit ist häufig unschwer an ihren oft vielmehr im Vordergrund stehenden eigentümlichen Erscheinungen oder an den hochgradigen Verbildungen an den Wirbeln zu erkennen.

Ganz anders hingegen verhält es sich mit dem Abgleiten des fünften, seltener des vierten Lendenwirbels, wenn es seinem pathologisch anatomischen Bild nach der Spondylolisthesis einzureihen ist. Gilt doch diese seit den umfassenden Arbeiten Neugebauers als eine Erkrankungsform eigener Art mit einem eindeutigen pathologisch anatomischen Befund, der damit den Rahmen jener oben angeführten Wirbeldislokationen verläßt.

Schon die Lokalisation an der Lendenkreuzbeingegend ist für das Wirbelgleiten im engeren Sinne typisch und in jedem Falle zu fordern. Wie schon betont, ist es nicht die Wirbelverchiebung schlechthin, auch wenn sie an der Lumbosacralgegend auftritt, die ans zur Diagnose der Spondylolisthesis berechtigt, sondern unser Augenmerk ist vielmehr auf jene anatomischen Veränderungen des Gleitwirbels und seiner Unterlage gerichtet, die seit Neugebauer als Bedingung und Ursache für das Gleiten anzusprechen sind. Um die Bedeutung jener Forderungen Neugebauers zu verstehen muß man wohl bedenken, daß zu Beginn des Wirbelrutschs keineswegs jene schweren destruktiven Veränderungen angetroffen werden, die z. B. bei Tabes eine Verchiebung der aufbauenden Elemente kaum noch beachtenswert erscheinen lassen. Vielmehr weist der Gleitwirbel wenigstens im Anfang des Leidens so geringe Veränderungen auf, daß diese der oberflächlichen Betrachtung entgingen, würde nicht schon eine unbedeutende Verchiebung Veranlassung geben, nach den urfächlichen krankhaften Veränderungen zu fahnden. Eine Unterbrechung jener, für den normalen Halt so wichtigen knöchernen Sicherung, die in der konstruktiven Verhakung durch die kleinen Gelenkflächen ihren Ankerpunkt hat, ist für die Spondylolisthese die wesentliche Voraussetzung. Sie tritt stets an symmetrischer Stelle in jenem Teil des Bogens des Gleitwirbels, der sich zwischen oberem und unterem Gelenkfortsatz dazwischenglagert, auf. Es entsteht somit in dem Zwischengelenkstück ein Spalt, der je nach dem Grad der Verchiebung verschieden weit klafft und nur mit derbem Fasergewebe ausgefüllt ist. Denn nicht der ganze Wirbel setzt sich nach vorne unten in Be-

wegung, sondern es verbleibt das abgelöste hintere Bogenstück an ursprünglicher Stelle und gibt keine Gelenkverbindung mit dem nächst tieferen Wirbel nicht auf. Es gleitet daher nur der Körper mit der Bogenwurzel und den oberen Gelenkfortsätzen ab. Mit dem langsamen Fortschreiten des Wirbelrutschens aber machen sich weitgehende sekundäre Veränderungen bemerkbar, sowohl am Gleitwirbel, wie auf der Gleitfläche. Der spondylolistetische Wirbel ist durch den Verlust des gelenkigen Haltes unter dem beträchtlichen Gewichtsdruck zu abnormen Bewegungen befähigt, die einen dauernden Reiz ausüben und zu Abbau und Umbau der Knochen- und Knorpel Elemente im ganzen Gebiet führen. Dies macht sich vor Allem bemerkbar in einer Veränderung der Form des fünften Lendenwirbels, da das Gewicht des Rumpfes sich nicht mehr gleichmäßig auf dem massiven Wirbelkörperblock verteilt, sondern zunehmend nur seinen hinteren Abschnitt belastet. Hier zeigen sich bisweilen tiefe Impressionen durch die sich einbohrende vordere Kreuzbeinkante, Defekte als Zeichen der Abscherwirkung, im Innern des Körpers eine reaktive Umlagerung der ganzen Stützsubstanz mit reicher Kalkanlieferung zu den tragenden Teilen. Analoge Umbildungen vollziehen sich auch im ersten Kreuzbeinwirbel. Unter dem Einfluß der ungleichen Belastung bilden sich Druckatrophien, Sklerosen, exostosenartige Wucherungen, die teilweise den Bandscheibenraum überbrücken. Am eindrucksvollsten jedoch sind die Störungen an der Bandscheibe, der für das Wirbelgleiten wohl eine ebenso große Bedeutung zukommt, als dem Bogendefekt. Sie ist ja wegen der besonderen Beanspruchung gerade am Übergang von der beweglichen Lendenwirbelsäule zum starren Kreuzbein und durch die Winkelbildung zwischen diesen beiden Abschnitten leicht Schädigungen unterworfen, die zum Verlust ihrer Elastizität und Störungen in dem hochwertigen Fasernknorpel führen. Es ist daher nicht verwunderlich, daß mit dem Verlust der Widerstandsfähigkeit gegen die einwirkenden Kräfte die Bandscheibe nachgiebig wird, und in ihrer Masse sich ein weitgehender Umbau vollzieht. Gleichlaufend mit dem langsam fortschreitenden Abrutschen setzt eine Zermürbung und Zerfaserung des Knorpelgewebes ein, die von einer Osteochondrosis und einer auf den Gallertkern und die Knorpelgrundplatte übergreifenden Zerstörung gefolgt wird. Diese Bandscheibendegeneration äußert sich durch die Abnahme der Zwischenwirbelraumhöhe und die Sklerose der angrenzenden Wirbelkörperflächen. Als eine Art Selbstheilung muß man es auffassen, wenn die Bandscheibe, die zu einer dünnen Membran zusammengepreßt, mit straffem Bindegewebe und sklerosierendem Knochengewebe nach und nach durchwuchert und schließlich ganz ersetzt wird, sodaß aus dem nachgiebigen Fasernknorpel eine starre, die beiden Wirbel verbindende Masse entsteht und ein weiteres Abrutschen unmöglich macht.

Auch der an seiner Stelle verbliebene Bogenteil mit dem Dornfortsatz gerät unter eine gewisse Druck- und Torsionswirkung durch die allgemeine Verlagerung der einzelnen, durch Bänder und Weichteile miteinander verbundenen Knochenelemente, in die er gleich einem Sesambein eingeschlossen ist. Die drehenden Kräfte, die am Dorn des Gleitwirbels ansetzen, verursachen also eine winkelige Knickung des Wirbelbogens am Zwischengelenkstück. Diese Erscheinung der Winkelbildung für die Diagnose der Spondylolisthese im Röntgenbild zu ver-

werten hat Bragard angegeben. Sie bildet nämlich in vielen unklaren Fällen mit eines der sichersten Zeichen einer stattgefundenen Unterbrechung des Bogens im Zwischengelenkstück. Ist es doch beim Wirbelrutsch nach vorne von ausschlaggebender Bedeutung, Erkrankungen, wie die Spondylarthrosis def., oder neuropathische Arthropathien und andere auszuschließen. Gerade hier hilft häufig nur dieses einzige Zeichen der Bogenknickung, in der wir eine sichere Unterbrechung an der I. A. P. erblicken, zu der eindeutigen Feststellung der tatsächlichen Erkrankungsform, die oft nur in einer unbedeutenden Verschiebung des Wirbelkörpers ohne nennenswerte sekundäre Veränderungen kund wird.

Zugleich mit der Vorwärtsbewegung des Gleitwirbelkörpers tritt notwendig ein zweites Merkmal am Bogen in Erscheinung.

Während nämlich der Wirbelkörper mit der Bogenwurzel nach Lösung der knöchernen Sicherung sich nach vorne in Bewegung setzt, verbleibt der hintere Bogenrest mit seinen Proc. art. inf. in der ursprünglichen gelenkigen Verbindung mit den Quergelenken des ersten Kreuzbeinwirbels. So entfernen sich also die beiden Knochenenden an der Trennungsstelle gleichlaufend mit dem Grad des Wirbelrutsches. Dies führt schließlich zu dem bereits von Neugebauer beschriebenen Zustand des Dolychoplatyspondylus, worunter neben der Abplattung die Streckung der Bogenfüngen zu verstehen ist. Diese Ausziehung des Bogens in der Pfeilrichtung ist unter anderem ebenfalls beweisend für einen bestehenden Bogendefekt. Sie wird am besten gemessen an der Entfernung des hinteren Wirbelkörperendes zum Proc. art. inf. Bei guter Projektion des unteren Gelenkfortsatzes ergeben sich wohl immer eindeutige sichere Maßzahlen, die eine Verlängerung des Gleitwirbelbogens beweisen.

Neben der Knickung und Elongation bilden sich am Bogen und Dorn sowohl durch das Abgleiten als auch durch die Abnahme der Bandscheibenhöhe unter dem dauernden Reiz der scheuernden Bewegungen breite gelenkige Berührungsflächen mit den entsprechenden benachbarten Wirbelteilen. Mit zunehmendem Gleiten vergrößert sich der Spalt im Zwischengelenkstück, der sich mit derbem Bindegewebe füllt. In dieses wenig widerstandsfähige Gewebe bohren sich tief die Proc. art. inf. des L. IV ein, die ebenfalls eine weitgehende Deformierung erfahren.

Diese lokalen Umbauprozesse werden unter der zunehmenden Wirbelverschiebung, die nicht nur eine Verlagerung des Körperschwerpunktes herbeiführt, sondern auch die Wirbelfäule als funktionelles, den Körper aufrichtendes Organ schädigt, von Allgemeinreaktionen des gesamten tragenden Stützapparates begleitet.

Es zeigen sich demnach an der Wirbelfäule Umbildungen, die als Versuche des Körpers aufzufassen sind, den ungenügenden Halt, wie die Schwerpunktsverlagerung auszugleichen. Die hochgradige Kyphose des Kreuzbeines, die häufig am Spondylolisthesis-Skelett beobachtet wird, entsteht unter dem Einfluß der Vorwärtsverlagerung des Gewichtsdruckes. Bildet doch das Kreuzbein keineswegs für die auf ihm lastende Lendenwirbelfäule ein starres Fundament, sondern es versucht unter den Reizen des veränderten Druckes dem nach vorne abgleitenden Wirbel eine möglichst große Stützfläche anzubieten. So findet eine schnabelartige Ausziehung seiner vorderen Kante statt, zugleich mit einer wulstartigen Knochen-

anlagerung, die für den Gleitwirbel ein breites Fundament schaffen und einen Ausgleich jener vermehrten Flächenneigung bilden soll. Besonders beachtenswert erscheint die für den Gleitwirbelkranken typische Abflachung der Brustkyphose. Die Vorwärtsverlagerung im Lendenteil ließe eher eine starke kyphotische Ausladung im Brustabschnitt erwarten, entsprechend ähnlichen kompensatorischen Umstellungen, wie sie als Ausgleich einer vermehrten Lendenlordose bei der angeborenen Hüftluxation oder einer rachitischen Lordose die Regel sind. Nach dem Verlust der festen Verbindung mit dem Kreuzbein durch die beiderseitige Durchtrennung im Bogen ruht der letzte Lendenwirbel als Träger des Rumpfes gleichsam nur auf einem Wasserkissen. Die breitflächige Verbindung des letzten Lenden- und ersten Kreuzbeinwirbels mit der Bandscheibe verhindert zwar eine stärkere Verschiebung, läßt aber gleich einem Kugelgelenk mit zu breiter und flacher Pfanne Bewegungen nach jeder Richtung zu. Trifft dies auch nicht für die gesunde Zwischenwirbelscheibe mit ihren elastischen und aktiv aufrichtenden Kräften zu, die auch bei der Spondylolyse den Wirbel in seiner normalen Lage zu halten vermögen, so gewährt doch die geschädigte Bandscheibe dem von seiner Verankerung losgelösten Wirbel nicht mehr den sicheren Boden. Dies äußert sich sowohl in der einsetzenden Verschiebung als auch in dem Bestreben des Körpers, diesen schweren Einbruch in seine Stabilität zu kompensieren. Durch die Aufrichtung der Wirbelsäule vor allem im Brustteil wird den bei normaler Krümmung nach vorne wirkenden Kräften am besten gesteuert. In das Bestreben, ein weiteres Abgleiten zu verhindern und den frei sich aufbauenden Oberkörper für die tragende Hüfte im Gleichgewicht zu halten, wird auch der Beckenkreuzbeingürtel mit einbezogen. So verringert sich die Beckenneigung sowohl als Antwort auf die Vorwärtsverlagerung der Fallinie, als auch um die Neigung der Gleitebene zu verringern. Der unsichere Halt auf dem Kreuzbein muß ferner durch erhöhte Muskelfspannung des Sacrospinalis einerseits und des Iliopsoas andererseits ausgeglichen werden. Ebenso versuchen die geraden Bauchmuskeln mit den langen Rückenstreckern als Antagonisten den Verlust der Stabilität zu ersetzen. So stellen sich als Folge dieses dauernd vermehrten Tonus häufig Veränderungen an der Muskelfsubstanz, Myogelosen, ein. Unter der gleichen Wirkung erfährt der Beckenring eine Umbildung. Insgesamt weist er einen derbknochigeren Bau auf. Der Schambogen ist mit der Abnahme der Conjugataneigung nach oben geschwenkt. Schließlich stellt sich an den Sacroiliacalgelenken eine Arthrose ein.

Die Spondylolisthese bietet also ein, in mancher Beziehung den örtlichen wie den Allgemeinerscheinungen nach recht charakteristisches pathol. anat. Bild. Erst in neuester Zeit ist es gelungen, das Wirbelgleiten im Röntgenbild zu erfassen. Gerade die Lendenkreuzbeingegend bereitet der röntgenologischen Darstellung die größten Schwierigkeiten. Die vielen ungewohnten ineinanderprojektionen, die sich bei der Seitenaufnahme aus der Überdeckung, vor allem durch die massiven Darmbeinflügel, in der Frontalen durch die Abdeckung der wichtigen Bogen- und Gelenkanteile durch die Wirbelkörper ergibt, ließen lange keine brauchbaren Bilder entstehen. Die Fortschritte der Röntgentechnik haben aber heute die Darstellung so verfeinert, daß das Röntgenbild der Spondylolisthese nicht nur diese krankhaften Veränderungen aufzufinden gestattet, sondern über

ihren feineren Bau und die Natur des Leidens wichtige Feststellungen zuläßt. Es ist eine überaus reizvolle Aufgabe, sich in die Röntgenbilder Gleitwirbelkranker zu vertiefen, führen sie auch in ein für die Deutung sicher schwieriges Gebiet, so bedeuten jene vom Normalen abweichenden Befunde dem Betrachter nicht bloß Ausdruck eines krankhaften Zustandes, sondern sie entrollen dem lebend Denkenden ein eindrucksvolles Bild über das Zustandekommen jener Veränderungen, über die weitgehende Möglichkeit der Umformung der Wirbelsäule unter dem Einfluß ihrer gestörten Festigkeit.

Lambl nahm eine Einteilung des Gleitprozesses nach der veränderten Lagebeziehung des fünften Lendenwirbels zum Kreuzbein vor. Er unterschied eine Lysis, Clisis, Olithesis, und Ptofis, künstlich abgegrenzte Zustandsbilder im Verlauf dieser Erkrankung. Von Bedeutung für die röntgenologische Beobachtung und das Studium der Pathologie dieser Krankheit sind weniger die vollendeten Grade von Ptofis, die als seltener Endzustand wohl den Geburtshelfer beschäftigen, als vielmehr jene Formen, die noch deutlich die Entwicklung der einzelnen Veränderungen zurückverfolgen lassen. Es ist daher zweckmäßiger, im Rahmen einer röntgenologischen Studie nur die ersten drei Stadien Lambls zu behandeln und diese je nach dem Grade der sekundären path. Veränderungen unter beginnende und fortgeschrittene Fälle von Spondylolisthesis zusammenzufassen.

In dem mir an der Orthopädischen Universitätsklinik zur Verfügung stehenden Krankengut von 22 Gleitwirbelpatienten fanden sich 10 Fälle, die neben einer Spondylolyse nur eine geringgradige Verschiebung des 5. Lendenwirbels aufwiesen, ohne wesentliche reaktive Verbildung der normalen Form und des normalen Aufbaues des Gleitwirbelbezirkes.

Im Folgenden sollen Röntgenbefunde aufgezeigt werden, die für den Beginn des Wirbelrutsches als charakteristisch gelten mögen. Ich möchte dabei nicht verfehlen auf besondere Formen hinzuweisen. Wenn sich auch kaum zwei völlig entsprechende Fälle finden, bei denen die mechanischen Bedingungen für die Entwicklung des Zustandes die gleichen sind, so stellen sich doch die bedeutsamen Veränderungen mit Gesetzmäßigkeit ein. Es können ja für das Gleiten nicht gleichgültig sein die Beziehungen des Femur, des Schenkelhalses zum Becken, eine bestehende Hüftluxation, die Beckenneigung und die Kreuzbeinform in ihrer so stark variierenden Einstellung, kurz alle Möglichkeiten, die sich aus dem individuell verschiedenen Aufbau des tragenden Fundaments ergeben. Unberücksichtigt bleiben noch jene, gerade an diesem entwicklungsgehistorisch unruhigsten Punkte häufig vorkommenden Fehlbildungen, die eine andere Beurteilung eines Zustandes erfordern. Und doch finden wir gewisse typische Veränderungen in jedem Röntgenbild Spondylolisthesiskranker. Dies gilt aber nur mit der Einschränkung, daß die Frontalaufnahme die geringen Veränderungen des beginnenden Gleitens nur unvollkommen wiederzugeben vermag. Es ist ja einleuchtend, daß weder die Verschiebung, die sich in der Strahlenrichtung vollzieht, noch Veränderungen, die in dieser Richtung vor sich gehen, nur schwer zu deutende und unsichere Erscheinungen auf der flächenhaften Projektion machen. Somit kann die dorso-ventrale Aufnahme, die lange als die einzige Möglichkeit, die Lumbo-Sacralgegend darzustellen galt, für die Diagnose und das Studium des beginnenden

Gleitens nicht mehr als ein, die räumliche Vorstellung erleichterndes Hilfsmittel sein. Hier leistet sie aber viel, ja sie führt häufig zur Aufdeckung neuer Befunde, sodaß sie auch heute notwendig und stets anzufertigen ist. Als Ausgangspunkt für die Betrachtung beginnender Spondylolisthese kann daher die dorso-ventrale Aufnahme nicht verwendet werden. Umfomehr gilt jene eingangs angeführte Angabe, daß bereits die beginnende Erkrankung deutliche röntgenologische Abweichungen ergibt, für das seitliche und schräge Bild.

Br. W.: Die seitliche Röntgenaufnahme läßt in der Übersicht vor Allem die normale Größe der physiologischen Krümmung im Lendenbrustabschnitt vermissen, die sonst von der Lendenlordose zu dem kyphotischen Bogen der Brustwirbelsäule überführt. Ferner fällt die starke Wölbung des Kreuzbeinbogens auf, der in seinem oberen Teil faßt waagrecht verläuft und die Beckenlichtung gleichsam überdeckt. Es entsteht somit eine im Beginn des Wirbelrutsches häufig anzutreffende Form der Wirbelsäule, die wegen ihres besonderen Verhaltens an jene Lockerung des festen Gefüges im Lendenkreuzbeingegebiet hinweist. Es erhebt sich die Frage, ist ein solcher Zustand schlechtweg als eine Lordose der Lendenwirbelsäule aufzufassen, die doch eine Gegenkrümmung in der Brustwirbelsäule zur Folge hätte. Wohl besteht der Ansatz für den einen Viertelbogen in der Kreuzbeinparabel; diese wird aber nicht durch eine zweite ausgleichende, die Lordose vervollständigende Bogenkurve weitergeführt, sondern es baut sich ohne jede Krümmung die Lendenwirbelsäule auf dem Sacrum arcuatum auf. So entsteht denn eine Aufbaustörung, die im Profil wohl als eine Vorwärtsverlagerung der Lendenwirbelsäule, nicht aber als eine Lordose im Lumbosacralgebiet imponiert. Diese eigentümliche Form der Wirbelsäule ist nicht ursprünglich durch den besonderen Bau des Kreuzbeins bedingt, sondern als eine reaktive Umbildung durch den beginnenden Wirbelrutsch aufzufassen.

Neben dieser Störung allgemeiner Art zeigen sich auf dem Röntgenbild überraschend gut die örtlichen Veränderungen. An der Verbindungslinie der vorderen Wirbelkörperkonturen kommt die Verschiebung des 5. Lendenwirbels zunächst gar nicht zum Ausdruck; erst eine stufenförmige Unterbrechung der entsprechenden hinteren Begrenzungslinie weist auf die Verlagerung hin. Welche Umformung der Kreuzbeinvorderkante die Vorwärtsbewegung des Gleitwirbels nicht erkennen läßt, soll später erwähnt werden. Als eindrucksvollster Befund aber stellt sich ein klaffender Spalt im Bogen dar, der im Zwischengelenkstück die beiden Gelenkfortsätze trennt. Nur geringe Randwucherungen umsäumen den Defekt, während wesentliche Kallusbildungen, wie wir sie sonst an jeder Bruchstelle beobachten, hier vollends fehlen. Ebenso vermissen wir hier überbrückende Knochenpangen, die eine feste Verbindung der beiden Bogenstücke herbeiführen könnten. Die Unterbrechung der einheitlichen Bogenspanne trennt also den Gleitwirbelkörper mit der Bogenwurzel und dem oberen Gelenkfortsatz vom hinteren Bogen an der I. A. P. (= Interartikularportion), der in Verbindung mit seinem Kreuzbeingelenk bleibt. Der freie Wirbelkörper, der nun des knöchernen Haltes am Kreuzbein entbehrt, hat eine Verlagerung erfahren, die allerdings nicht sehr erheblich ist. Schon aus dieser geringen Verschiebung ergeben sich eine Reihe beachtlicher röntgenologischer Besonderheiten. Mit dem Auseinanderweichen der freien Bogen-

stücke unter der Verschiebung stellen wir zunächst eine Verbreiterung des Wirbelkanals in der Pfeilrichtung fest. So ist also die Maßstrecke vom hinteren Wirbelkörpertrand zum unteren Gelenkfortsatzwinkel im Vergleich zur selben meßbaren Entfernung der übrigen Lendenwirbel vergrößert. Diese Verbreiterung beträgt hier einen halben Zentimeter.

Der verbliebene Dornfortsatz mit dem Proc. art. inf. weist keine Veränderung weder in seiner Form, noch in seiner Lage zum Kreuzbein auf. Seine hintere Spitze überragt gleich dem 7. Halswirbel die dorsale Begrenzung der Dornreihe der übrigen Wirbel, sodaß ein kleiner Sattel entsteht. Dies ist aber nicht die Folge einer sekundären Verdrängung des Dorns, sondern durch die Vorwärtsverlagerung der mit dem Gleitwirbel verbundenen und auf ihm sich aufbauenden gesamten Wirbelsäule zu erklären. Damit entsteht jener Absatz, der in den meisten Fällen bei der klinischen Untersuchung deutlich zu fühlen ist. Eine gleiche Stufenbildung zeigt sich im Verfolg der hinteren Kreuzbein-Lendenwirbelkörperkontur. Sie gilt mit der Elongation des Bogens als ein erstes Symptom des Gleitens im seitlichen Röntgenbild. Die Tiefe der freien Kreuzbeinstufe gibt den besten Anhaltspunkt für die genaue Bestimmung des Wirbelrutsches. Der Gleitwirbelkörper weist ebenso wie der erste Kreuzbeinwirbel Verdichtungen der Spongiosa besonders gegen die Gleitfläche hin auf. Diese sind als Ausdruck der veränderten Belastungsbedingungen und abnorm wirkfamen Kräfte zu betrachten. Besondere Erwähnung verdient die Umbildung, die sich unter dem Einfluß der Spondylolisthesis am ersten Kreuzbeinwirbel vollzogen hat. Wie Walther Müller und Zwerg dargelegt haben, ist das Kreuzbein in dem Bestreben, seinen Flächenneigungswinkel zu erhalten, weitgehender Umformung fähig. Es ist kein Zweifel, daß diese besondere Form des Sacrum arcuatum sicher im geringen Grade schon vorher bestanden hat. Diese vermehrte Krümmung, die im oberen Teil zu einer Horizontalen ausläuft, erfährt sie erst unter dem Einfluß des Gleitens. Darauf weist schon jene dichte Zeichnung in dem kleinen konvexen Bogen hin, die durch die Druckwirkung zustande gekommen ist. So stellt sich also das Kreuzbein in der Aufnahme in folgender Weise dar: Es überdacht in seinem oberen Teil die Beckenlichtung, indem der erste Kreuzbeinwirbel den Anschein erweckt, als wollte er dem Gleitwirbel in der Vorwärtsbewegung folgen. Dadurch kommt er in eine abnorme horizontale Achsenstellung. Dieser Eindruck verstärkt sich noch durch den lippenförmigen Anbau an seiner vorderen Kante, sodaß diese wie ausgezogen erscheint. So findet auch der eingangs erwähnte eigenartige Wirbelsäulenaufbau seine Erklärung, der noch besonders durch die sagittale Verschiebung durch das Gleiten betont wird. Der Bandscheibenraum hat unter der geringen Verlagerung noch seine normale Keilform erhalten. Auch vermissen wir Zeichen degenerativer Veränderungen, die in einer Abnahme der Höhe frühzeitig zum Ausdruck kämen.

Zusammenfassend ergibt sich aus dem seitlichen Röntgenbild folgender Befund. Eine beginnende Spondylolisthesis des 5. Lendenwirbels mit einem deutlich erkennbaren Spalt in der I. A. P. des Bogens. Die geringe Verlagerung hat bereits zu einer besonderen Form des Wirbelsäulenaufbaues geführt, die für das Gleiten als typisch gelten kann. Die starke Wölbung des Kreuzbeines ist nicht

zuletzt durch einen Umbau entstanden. An der Bandscheibe haben tiefergreifende Veränderungen nicht stattgefunden.

Die ergänzende dorso-ventrale Aufnahme zeigt bei flüchtiger Betrachtung zunächst völlig normale Verhältnisse. Erst die geforderte Beobachtung der einzelnen Wirbelelemente läßt einige abweichende Besonderheiten entdecken, die aber trotz der vollendeten Aufnahmetechnik nicht so eindeutig sind, als daß wir sie nicht auch bei der Lendenlordose einer gefunden Wirbelsäule fänden. An der Beckenfigur und den Hüftgelenken kann kein krankhafter Befund erhoben werden. Ebenso weist die Wirbelsäule wenigstens im Lendenabschnitt keine seitliche Abweichung im Sinne einer Skoliose auf. Mit Ausnahme des 5. Lendenwirbels kommen alle Wirbel in ihrer Zeichnung deutlich zum Ausdruck. Wegen seiner Neigung zur Waagrechten wird diese von den auffallenden Strahlen in diagonalen Richtung durchdrungen. Daher zeichnet sich nur seine untere Begrenzung scharf ab, während die übrigen Umrisslinien nur schwer anzugeben sind. Besser stellt sich der Bogen mit dem Proc. Spin. dar, obwohl er vom Wirbelkörper Schatten überdeckt wird. Der Bogenanteil des Gleitwirbels, auf den sich unser besonderes Augenmerk richtet, fällt nicht nur durch seine vermehrte Zeichnung, sondern wegen der Veränderungen am Zwischengelenkstück auf. In der Sklerosierung der beiden Bogenchenkel kommen jene durch Zug und Drehung abnorm wirkenden Kräfte zum Ausdruck, gegen die sich die Bogenpange durch Kalkeinlagerung und Verfestigung ihres Gewebes zu schützen versucht. Besonders aber treten durch ihre außergewöhnliche Bildung die seitlichen Teile des Bogens im Gebiet der Quergelenkfortsätze hervor. Die wolkigen Aufhellungen und Verdichtungen, die den wenig differenzierten Bezirk ausfüllen, kennzeichnen die mannigfaltigen Ab- und Umbauvorgänge, die sich hier abspielen. Die Verbreiterung und Begrenzung des Schattens ist so unregelmäßig, daß sie nicht allein von den im Profil getroffenen Gelenkflächen herrührt, sondern im Sinne einer seit langem bestehenden Rarefizierung des Knochens mit reaktiven Wucherungen zu werten ist. Neben dem linken Gelenkspalt, der in einer Schrägen von links außen oben, nach unten innen durch den Bogen zieht, erkennen wir an der I. A. P. eben den Anfangsteil jenes Defektes, der die beiden Gelenkfortsätze trennt. Es gelingt selten und da nur durch Zufall im dorso-ant. Bild diesen Bogendefekt als wirklichen Spalt einwandfrei zu erkennen. Projiziert sich doch dieser nur in den wenigsten Fällen in der Strahlenrichtung. Am rechten Bogen z. B. ist diese Unterbrechung nicht deutlich sichtbar. Soweit die flächenhafte Projektion einen Rückschluß auf die wirklichen Verhältnisse zuläßt, ist der Bandscheibenraum in seiner vorderen normalen Höhe erhalten, was aus der Begrenzung durch die untere vordere Lendenwirbelkante und der oberen Kreuzbeinkante hervorgeht. Spangenförmige Überbrückungen oder exostosenartige Bildungen, die von den beiden Wirbelkörpern ausgehen, sind nicht zu beobachten. Der erste Kreuzbeinwirbel erscheint in der Aufsicht, sodaß Wirbelkanal und Bogen sichtbar sind. An der Figur des Kreuzbeins sowie an seiner Verbindung mit den Darmbeinen ist keine pathol. Veränderung festzustellen. Die dorso-ventrale Aufnahme gestattet also wohl Anhaltspunkte für die krankhaften Vorgänge bei der beginnenden Spondylolisthese zu finden, ihre Deutung aber ist infolge der ungünstigen Projektion erschwert, sodaß aus dem dorso-

ant. Bild weder der Grad der Verschiebung ersichtlich ist, noch eine sichere Diagnose des „echten“ Gleitens gestellt werden kann. Aber nicht nur um etwaige weitere krankhafte Erscheinungen aufzudecken, sondern auch um andere Erkrankungen der Wirbelsäule auszuschließen, ist das andere Bild unentbehrlich.

Ungefähr denselben Grad der Wirbelverschiebung zeigen die Röntgenbilder des Patienten St. Seitliche Aufnahme: Der Wirbelrutsch zwischen dem letzten Lenden- und ersten Kreuzbeinwirbel beträgt gut $\frac{1}{2}$ cm. Auch in diesem Falle sind jene typischen Zeichen des beginnenden Wirbelgleitens festzustellen. Wir vermissen nicht den für dieses Leiden so charakteristischen Defekt im Zwischen-gelenkstück, der als eine bandförmige Aufhellung hinter dem Proc. art. sup. quer den Bogen des 5. Lendenwirbels durchtrennt. Mit der beginnenden Entfernung des 5. Lendenwirbelkörpers und seiner Bogenwurzel von dem an ursprünglicher Stelle verbliebenen Bogenrest, ist bereits eine deutlich meßbare sagittale Verbreiterung des Wirbelkanals eingetreten. Verdichtungen im Bereich der beiden Bogen-teile deuten auf die „Unruhe“ in diesem Bezirk. Dies trifft besonders für die Proc. art. zu, die gegen die Gelenkfläche hin vermehrten Kalkgehalt aufweisen. Neben der Erhöhung der Gewebefestigkeit beantworten die unter dauernd großem Druck stehenden und durch abnorme Bewegungen geschädigten Quergelenke jene Reize mit einer periarticulären Knochenanlagerung, die eine Verlängerung des Gelenkspaltes im Röntgenbild zur Folge hat. An der hinteren Wirbelkörper-grenzlinie beobachten wir eine Stufenbildung, die die dorsale Kreuzbeinkante als eine freie Konsole hervortreten läßt. Die Vorwärtsbewegung des 5. Lenden-wirbelkörpers, die hier so deutlich zum Ausdruck kommt, wird an der vorderen Wirbelgrenzlinie durch einen lippenförmigen Vorbau am 1. Kreuzbeinwirbel verschleiert. Durch diese Ausziehung der vorderen Kreuzbeinkante setzt sich der kyphotische Bogen des Sacrum noch weiter gegen ventral fort, sodaß vor allem durch die Formveränderung des 1. Sacral-Wirbels ein ausgesprochenes Sacrum arcuatum entsteht. Deutliche Gleitfurchen hat der Wirbelrutsch auch durch abnorme Druck- und Drehwirkung an der Bandscheibe und der fundamentbildenden Kreuz-beinfläche gesetzt. Neben einer Verminderung der Bandscheibenhöhe besonders im hinteren Abschnitt durchzieht eine streifige Zeichnung den sonst einheitlichen Zwischenwirbelraum. Seine untere Begrenzung durch die Kreuzbeinfläche ist wenig scharf, sodaß eine stellenweise beginnende Zerstörung der Knorpelgrundplatte angenommen werden muß. Ein exostosenartiger Fortsatz am hinteren Kreuz-beinwinkel weist auf die zerrenden Kräfte, die sich besonders hier an der hinteren Randleiste geltend machen. An der hinteren Gleitwirbelkante, wie an der entsprechenden Druckstelle am Kreuzbein zeigt sich eine starke Sklerosierung des Knochens. Was die allgemeine statische Umformung der Wirbelsäule betrifft, so berechtigen die geringen Eigenheiten des Bogenfacrums und der etwas aufgerichtete obere Lendenabschnitt nicht von einer besonderen, durch ausgleichende Vorgänge entstandenen Wirbelsäulenform zu sprechen.

Im Frontalbild erweisen sich das Becken und die Hüftgelenke als normal. Die Kreuzdarmbeingelenke sind durch keine arthritischen Wucherungen verbildet. An den hinteren oberen Darmbeinstacheln deuten Aufrauungen und Ausfrangungen des glatten Randes auf den vermehrten Muskelzug und die straffe Span-

nung der tiefen Fascia lumbodorsalis hin. Der fünfte Lendenwirbel überdeckt in der Aufnahme als nicht abzugrenzender durchschießender Schatten den 1. Kreuzbeinwirbel. Letzterer gelangt wegen seiner starken Neigung gegen die Beckenrichtung in der Aufsicht zur Darstellung. Als eine entwicklungsgeschichtliche Fehlbildung beobachten wir eine mediane Bogenpalte im 1. Sacralwirbel. Die beiden Bogenhälften haben sich, nachdem die Anlage des Dornfortsatzkernes unterblieben ist, nicht geschlossen. Beachtenswert sind die Bogenveränderungen des Gleitwirbels. Unregelmäßige, fleckige Schatten, unterbrochen durch Aufhellungen in den seitlichen Bogenabschnitten, besonders links, deuten auf den reaktiven Knochenumbau im Bereich des Zwischengelenkstückes hin. Der im seitlichen Bild deutliche Bogendefekt ist hier nicht aufzufinden.

E. R.: Ein weiterer Fall von beginnender Spondylolisthese gab wegen des eigenartigen Verlaufes des Bogendefektes im seitlichen Röntgenbild zu besonderen Überlegungen Veranlassung. Seitliche Aufnahme: Die Verschiebung des 5. Lendenwirbels auf dem Kreuzbein ist deutlich sichtbar und beträgt, gleichgültig, ob an der hinteren freien Kreuzbeinkonsole, oder an der Elongation des Wirbelkanals gemessen, $\frac{1}{2}$ cm. An seiner ursprünglichen Stelle und in der gewohnten Beziehung zum Kreuzbein finden wir den Dornfortsatz und den hinteren Bogen mit Proc. art. inf. Der Defekt ist auf zwei angefertigten Röntgenbildern als eine bandförmige Aufhellung sichtbar, verläuft aber nicht in der gewohnten Richtung senkrecht zur Bogenachse, sondern er zieht in einer Schrägen vom unteren Gelenkfortsatzwinkel in der Richtung zum Dorn, sodaß der obere Teil des Zwischengelenkstückes noch in Verbindung mit der Bogenwurzel zu bleiben scheint. Diese ungewöhnliche Spaltrichtung läßt keine eindeutige Erklärung zu. Ein Zufallsergebnis als Folge röntgenologischer Überschneidungen dürfte diese seltene Aufhellung nicht sein. Ebenso läßt sich eine isolierte Fraktur des Bogens, die gerade an dieser Stelle wohl kaum beobachtet worden ist, mit Sicherheit ausschließen. Vielmehr ist an den ursprünglichen, in der bekannten Richtung zum Bogen verlaufenden Spalt zu denken. Dieser hat sowohl durch den sich senkenden Dorn und eine geringe Randwucherung an der Bogenwurzel, diese eigenartige Verlaufsförmigkeit angenommen. Allerdings ist die Annahme auch nicht von der Hand zu weisen, daß die abnorme Spaltrichtung bereits von Anfang an bestanden hat. Jedenfalls weisen alle Zeichen der sekundären Veränderungen auf die ursächliche Spondylolisthese hin. Der Wirbelrutsch muß sich langsam vollzogen haben, da die fortschreitende Sklerosierung der beiden Bogenhälften erst durch die schon lange wirksamen pathologischen Reize sich ausbilden konnte. Ebenso zeigen der L. V. und S. I. besonders gegen den Bandscheibenraum hin vermehrten Kalkgehalt, sodaß die Spongiofazezeichnung kaum mehr zu erkennen ist. Morphologische Veränderungen an der Zwischenwirbelscheibe und dem 5. Lendenwirbel sind nicht vorhanden. Hingegen sehen wir an der Kreuzbeinvorderkante, wie in den früheren Fällen die lippenförmige Ausziehung, die sich als Stützexostose gegen den allmählich nach vorne wirkenden Gewichtsdruck gebildet hat.

Die dorso-ventrale Aufnahme bietet außer einer medialen Bogenpalte am 1. Sacralwirbel keinen neuen Befund. Verdichtungen der Bogenwurzeln des Gleit-

wirbels, vor allem links, weisen auch hier auf die bestehenden Zwischengelenkdefekte.

Eine bei der Wirbelschiebung selten genügend beachtete Erscheinung stellt die Änderung der Winkelbeziehung des abgelösten, an seiner ursprünglichen Stelle verbliebenen Dornfortsatzes zu dem in's Gleiten geratenen Wirbel und seiner Bogenwurzel dar. Nicht immer gelingt es auf der seitlichen Aufnahme, die im Ganzen die Veränderungen einer Spondylolisthesis aufweist, den Zwischengelenkdefekt zu entdecken, sei es, daß er in der Projektion durch Knochen Schatten sich überdeckt, oder daß er durch verkalkendes Fasergewebe sich bereits aufgefüllt hat. Hier läßt dann eine stärkere Winkelbildung im Verlauf der Bogenwurzel — Dornachse — doch die Annahme einer früheren Unterbrechung an der Knickstelle als gerechtfertigt erscheinen. Folgender röntgenologischer Befund zeigt diese angenommenen Verhältnisse deutlich.

Tr. Seitliches Bild. Die gesamte Rumpfwirbelsäule ist auf dem Kreuzbein um $\frac{1}{2}$ cm nach vorne abgeglitten. Im Bereich der Gleitebene, also am 5. Lenden- und 1. Sacralwirbel, haben sich sekundäre Umänderungen vollzogen, die als Gleitspuren zusammengefaßt werden können. Die obere Kreuzbeinfläche hat unter der ungleichen Druckwirkung besonders durch die dorsale Lendenwirbelkante, eine Eindellung im hinteren Drittel erfahren, die besonders durch die reaktive Wucherung in der Umgebung betont wird. An der Bandscheibe vermissen wir die nach vorne offene Keilform, ihre normale Höhe jedoch scheint erhalten. Eine Verbreiterung des belasteten Fundamentes ist auch hier durch den Knochenanbau an der vorderen Kreuzbeinkante erfolgt. Sklerosen im Gleitgebiet vervollständigen schließlich das Bild. Einen eindrucksvollen Befund ergeben schließlich die Veränderungen am Bogen des Gleitwirbels. Die Bogenwurzel, die im Proc. art. sup. sich deutlich gegen den dorsalen Bogenrest abgrenzt, steht in der sagittalen Achsenrichtung des Wirbelkörpers. Gleich hinter dem oberen Gelenkfortsatz zeigt sich eine eckige Abwinkelung des Bogens, der in einem langgezogenen, schmalen Schattenband ziemlich unvermittelt sich zum Dornfortsatz verbreitert. Der Dorn ist gleichsam durch die Bogenelemente des L. IV. auf dem Rücken des Kreuzbeins nach hinten gedrängt. Diese winkelige Abknickung, die in das Zwischengelenkstück fällt, ist nur mit einer Unterbrechung der Knochenspanne an dieser Stelle vereinbar. Der Defekt als solcher tritt in dieser Aufnahme nicht hervor, doch weisen unregelmäßige, wolkige Aufhellungen, die hier den dichten Bogen Schatten durchsetzen, auf den, vielleicht in Ausheilung begriffenen Bogen spalt. Diese starke Winkelbildung, die durchaus nicht bei jeder Bogendurchtrennung beobachtet wird, kann auf verschiedene Weise zustande kommen. Der von seiner Verankerung gelöste Wirbelkörper mit der Bogenwurzel führt häufig eine doppelte Bewegung aus: Er gleitet zunächst nach vorne, ohne seinen Neigungswinkel wesentlich zu ändern, was nur eine Elongation des Wirbelkanals bedingt. Eine Abknickung im Bogen aber kommt erst zustande durch die beginnende Schwenkung des Gleitwirbels nach unten, durch ein Zusammen sinken der vorderen Bandscheibenhöhe. Letzteres war hier Ursache der Bogenknickung. Häufiger allerdings scheint mir Folgendes der Fall zu sein. Bei der Aufrichtung des Beckens mit dem Kreuzbein folgt der Dorn und hintere Bogen, der dem

Kreuzbeinrücken durch den lastenden Druck angepreßt ist, diesem in der Bewegung, die mit der Schwenkung zu einer Veränderung der Winkelseinstellung führt. Es soll nicht verkannt werden, daß eine geringe Winkelbildung im Bogen sich auch bei vermehrter Lendenlordose findet. Aber auch eine entgegengesetzte Aufwärtsschwenkung des Dornes durch die veränderten Bedingungen des Wirbelrutsches ist durchaus bekannt. Der Proc. spinosus ist ja nicht ein freies Knochenstück, sondern gleich einem Sefambein in Bänder eingeschlossen. Mit der Vorwärtsbewegung des Gleitwirbels erfahren diese eine Dehnung, da sie mit diesem und den oberen Wirbeln verbunden ihrer Bewegung folgen müssen. Der eingeschlossene Dornfortsatz wird nun unter dem Zug der Bänder gekippt, mit dem Drehpunkt an der I. A. P. Es ergibt also bei starker Verschiebung der Wirbelkörper eine Aufwärtsbewegung der Dornfortsatzspitze, soweit keine Hemmung durch die benachbarten oberen Dorne stattfindet.

E. Eine beginnende Spondylolisthesis konnte bei einem anderen Patienten beobachtet werden, dessen Wirbelsäule im Röntgenbild eine schwere Spondylarthrosis aufwies. Die Verschiebung des 5. Lendenwirbels auf dem Sacrum ist, wie aus der seitlichen Aufnahme hervorgeht, nur gering. Allenthalben sehen wir arthritische Zacken und exostosenartige Spangen, die den Bandscheibenraum überbrücken, um mit dem Nachbarwirbel Verbindung aufzunehmen. Es überrascht auch nicht, wenn wir in der dorso-ant.-Aufnahme eben diese Veränderungen wiederfinden. Die Lendenkreuzbeingelenke weisen ebenso wie die Hüftpfannen deutliche Veränderungen auf. Weshalb mir diese Röntgenbefunde beachtenswert erscheinen, ist hauptsächlich die Frage, ob das Abgleiten des 5. Lendenwirbels nicht auf diese allgemeine Wirbelsäulenerkrankung zurückzuführen ist, oder als eine echte Spondylolisthesis betrachtet werden muß. Wie eingangs erwähnt, sind Wirbelverschiebungen bei schwerer Spondylarthrosis def. nicht selten und finden durch die destruktiven Veränderungen an den fixierenden Wirbelgelenken ihre Erklärung. Und doch kann im vorliegenden Falle der Wirbelrutsch nicht der Spondylarthrosis def. zugerechnet werden. Es ist kein Zufall, daß gerade der 5. Lendenwirbelkörper ins Gleiten geraten ist, während der hintere Bogen die Verbindung mit dem Kreuzbein beibehalten hat. Es handelt sich auch hier um jene entwicklungsgeschichtliche Fehlbildung, die zur Spondylolisthese Anlaß gegeben hat. Wie nämlich aus dem ventro-dorsalen Bild ersichtlich, besteht an der typischen Stelle, der I. A. P., ein Bogendefekt. Auch aus der seitlichen Aufnahme mag dieser Befund herausgelesen werden, wenn die ungleichen Schattenbildungen, die sich zu einem Spalt zusammengruppieren, keine Täuschung bewirken. Beweisend für die echte Spondylolisthesis können ja nicht so sehr die sekundären Gleitspuren als vielmehr der bestehende Bogendefekt sein.

Bei der Wichtigkeit des Nachweises dieser Spaltbildung im Zwischengelenkstück des Bogens hat sich neuerdings für die röntgenologische Darstellung der I. A. P. und der Gelenkelemente die Schrägaufnahme, wie sie von Albers-Schönberg für die Brustwirbelsäule angegeben wurde, als äußerst zweckmäßig erwiesen. Wenn auch die praktische Anwendung oft auf große Schwierigkeiten stößt wegen der notwendigen genauen Einstellung auf die stark variierenden Bogen- und Quergelenke, so vermögen doch gute Bilder die Veränderungen am Zwischen-

gelenkstück einwandfrei wiederzugeben. Die gute Seitenaufnahme macht allerdings häufig das Schrägbild überflüssig. Die Deutung auch des guten Schrägbildes ist zweifellos durch die ungleiche Einstellung der einzelnen Wirbelelemente zum Strahlengang und die dadurch entstehenden mannigfachen Überschneidungen und Verzeichnungen außerordentlich erschwert. Erst längere und wiederholte Vergleichsstudien mit besten Bildern am Skelett ermöglichen ein volles räumliches Verstehen auch der feineren Bildungen und pathologischen Abweichungen. Umso größer ist aber später die Freude an wohl gelungenen Bildern die sicheren krankhaften Veränderungen, vor allem bei der Spondylolisthesis, zu entdecken.

Eine Schrägaufnahme von dem Patient. I. zeigt z. B. mit welcher überraschender Deutlichkeit die Verhältnisse am Bogen und Wirbelkörper zum Ausdruck kommen. Der vierte Lendenwirbel, der das klassische Bild des normalen Lendenwirbels in der schrägen Ansicht bietet, sei zunächst Gegenstand unserer Betrachtung. Wir erhalten vor Allem einen Überblick vom Wirbelkörper, in dem wir die scharfen Konturen seiner Begrenzungsflächen gut erkennen. Keinerlei exostosenartige Bildungen stören den einheitlichen Linienverlauf. Eine fein-faserige Spongiofazeichnung erfüllt gleichmäßig den ganzen Wirbelkörper. An seiner dorsalen Begrenzung setzt jene merkwürdige Schattenbildung an, die in ihrem Umriß einer Schmetterlingsform gleicht. In diesem Schattenbilde vereinigen sich alle die Bogenelemente, die für die spondylolisthetischen Veränderungen von besonderer Bedeutung sind. Die beiden, wirbelkörpernahen Flügel werden gebildet vom oberen Gelenkfortsatz und dem Proc. transv. der im Profil getroffen ist. Die Wirbelfernen, vom unteren Gelenkfortsatz und dem hinteren Bogenabschnitt. Die beiden Quergelenkflächen liegen dachziegelförmig übereinander, sodaß der obere Gelenkspalt sich jeweils dorsal zum unteren einstellt. Dieses Verhalten ändert sich bei einer stattgefundenen Verschiebung nach einer Bogendurchtrennung im Zwischengelenkstück. Durch das schräge Bild wird ferner erzielt, daß gerade die I. A. P. in ihrer ganzen Ausdehnung und feineren Struktur trotz ihrer versteckten Lage sich darstellt. Unsicher können wir daher die Veränderungen am Bogen beim spondylolisthetischen Wirbel auffinden. Schon am nächst tieferen Wirbel, dem Gleitwirbel, finden wir diese schöne Schmetterlingsform des Bogen-schattens nicht mehr erhalten. Eine breite Durchtrennung, ein Defekt im Zwischen-gelenkstück, hat die einheitliche Verbindung der beiden Flügelpaare zerstört. Die klaffenden Ränder zeigen einen scholligen Zerfall neben infelförmigen Sklerosen. In diesen Spalt senkt sich der ebenfalls veränderte untere Gelenkfortsatz des L. IV. Als ein besonderes Charakteristikum dieser bestehenden Wirbelschiebung muß die Verlagerung des Quergelenkspaltes des Gleitwirbels zu dem nächst tieferen am Kreuzbein erwähnt werden. Die dachziegelförmige Anordnung ist hier verschwunden. Beide fallen in eine Linie mit dem unteren Gelenkspalt, was einer Vorwärtsbewegung des Gleitwirbelkörpers mit seinen oberen Quergelenken entspricht, während diese des Basis-Wirbels an ursprünglicher Stelle verblieben sind. Ferner zeigen die oberen Quergelenkflächen des Gleitwirbels eine deutliche Verbreiterung mit starken reaktiven Verdichtungen. Leichte arthritische Randanlagerungen an den Gelenken zeugen von abnormer Belastung. Der Gleitwirbelkörper hat eine Formveränderung nicht erlitten, jedoch zeigt er im Vergleich zum 4. Len-

denwirbel reicheren Kalkgehalt. Die praefacrale Bandscheibe zeigt eine leichte Höhenverminderung, läßt aber keinerlei Kalkeinlagerungen erkennen.

Die schräge Aufnahme, die den Wirbelbogen mit seinen Gelenken in so ausgezeichnete Weise zu erfassen vermag und Wirbelkörper mit der Bandscheibe gut darstellt, ist für die Erkennung der Spondylolisthesis von sehr großem Wert. So können besonders beginnende Fälle durch die Darstellung der I. A. P. sicher erfaßt werden und frühzeitig der Behandlung zugeführt werden.

Weitere 4 Fälle, Schn., B., Kl., I., aus dem vorhandenen Krankengut, die ebenfalls Frühformen des Spondylolisthesis darstellen, darf ich zum Anlaß nehmen, die röntgenologischen Besonderheiten des beginnenden Wirbelgleitens kurz zusammenzufassen.

Im Frontalbild lassen sich in diesem Stadium, wie bei den übrigen Patienten so auch hier, nur Veränderungen uncharakteristischer Art feststellen, die als Ausdruck der „Unruhe“ des Gleitwirbels gelten. Sie bestehen in zunehmenden Verdichtungen der Spongiosa vor allem gegen die Gleitfläche hin. Beachtenswert bleiben stets die Befunde am Bogen des Gleitwirbels. Obwohl sich das Zwischengelenkstück sehr ungünstig projiziert, tritt die Defektbildung hin und wieder deutlich hervor, sodaß damit ein wichtiges Symptom für die Diagnose angegeben werden kann. Häufig bekommen wir aber nur Andeutungen dieses bestehenden Bogenspaltes im Bild zu sehen, die sich in einer Verbreiterung der seitlichen Bogenpartien äußern. Sie ist durchbrochen von wolkigen Aufhellungen und unregelmäßigen Schattenbildungen, Zeichen, die auf einen langdauernden Knochenumbau als Folge der andersartigen Bedingungen durch den bestehenden Defekt hinweisen. Anhaltspunkte für die eingetretene geringe Verschiebung können im dorso-ant.-Bild nicht erbracht werden. In der seitlichen Aufnahme hingegen fällt gerade die Verlagerung besonders in die Augen. Bei den wenig fortgeschrittenen Fällen, die wir hier zusammenfassen, beträgt diese nicht mehr als einen Zentimeter; und doch zeigen sich schon deutlich die Gleitspuren und eine Reihe allgemeiner sekundärer Veränderungen der Wirbelsäule. Zu tiefergreifenden, stark deformierenden Prozessen am Gleitwirbel und der Gleitfläche hat der Wirbelrutsch in diesen Fällen noch nicht geführt. Nach wie vor stehen allerdings bei der beginnenden Spondylolisthesis die pathologischen Erscheinungen am Bogen, die im seitlichen Bild sich besonders gut kennzeichnen, im Vordergrund. Der trennende Spalt in der Zwischengelenksportion vergrößert den normalen Abstand vom hinteren Wirbelkörper und dem absteigenden Gelenkfortsatz. Häufig beobachten wir eine sekundäre Knickung an der Trennungsstelle. Diese kommt durch die isolierte Bewegung eines der beiden freien Knochenteile zustande. Sie besteht entweder in einer Kippung des Dornfortsatzes mit dem Drehpunkt an der unterbrochenen Zwischengelenksportion oder in einer Veränderung der Wirbelkörpereinstellung zu dem an Ort und Stelle verbliebenen hinteren Bogen. Einen tiefen Einblick in die Fähigkeit der statisch-dynamischen Einregulierung des Körpers gewährt das Studium der Formveränderung des Kreuzbeins unter dem Einfluß des Gleitens. Die Kräfte zielen hauptsächlich darauf ab, sowohl ein tragendes Fundament zu schaffen, als auch das gestörte Gleichgewicht wieder herzustellen. So beobachten wir eine Verbreiterung der Kreuzbeinfläche durch den

knöchernen Anbau und die Ausziehung der vorderen Kante, sodaß trotz der Verlagerung der Gleitwirbel einen genügenden Halt findet. Ferner ist die vermehrte Kyphose des Kreuzbeins als eine Gegenkrümmung gegen die starke Vorwärtsverlagerung der Lendenwirbelsäule zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichtes aufzufassen. Die auf allen Bildern beobachtete Abflachung der Bruckkyphose stellt eine wirksamere Maßnahme des Körpers, die Gewichtsverschiebung auszugleichen, dar.

Das Schrägbild, das zur geforderten Darstellung der Bogenelemente in einigen Fällen angefertigt wurde, gibt zum Teil jene oben beschriebenen Verhältnisse wieder, jedoch mit der besonderen Betonung der Feinheiten am Zwischengelenkstück und der angrenzenden Quergelenke. Aufhellungen neben unregelmäßigen Verdichtungen durchsetzen die getrennten Bogenschenkel gegen die I. A. P. hin. An der Gelenklinie der Quergelenke werden reaktive, wärzchenförmige Randanlagerungen mit vermehrtem Kalkgehalt beobachtet, die jede Spondylolytis begleiten und zu einer Verbreiterung der Gelenkfläche führen. Im Gegensatz zu diesen geringeren Veränderungen, wie sie bei der beginnenden Spondylolisthesis in der Röntgenaufnahme sich zeigen und zu jedem typischen Bild der Erkrankung gehören, finden wir in *fortgeschrittenen Fällen* neben einer beträchtlichen Verschiebung häufig ausgeprägte Verbildungen an Wirbeln und Bandscheibe, die der Krankheit zwar keinen neuen Charakter geben, aber in der Aufnahme besonders sinnfällig als schwerer pathologischer Zustand in Erscheinung treten.

S. M. Seitliche Aufnahme. Der 5. Lendenwirbelkörper mit Bogenwurzel ist auf dem Kreuzbein um 2 cm nach vorne unten abgeglitten. Daneben hat der Gleitwirbel sich beträchtlich geneigt, sodaß wir nicht nur jede aufrichtende Tendenz vermissen, wie sie gerade der 5. Zwischenwirbelscheibe des Lendenabschnittes eigen ist, sondern eine Unterschneidung des Flächenneigungswinkels des Kreuzbeins durch die untere Begrenzung des Gleitwirbels feststellen. Diese bedeutende Verschiebung und die dadurch bedingte ungleich große Belastung im hinteren Wirbelkörper- und Bogenbereich hat zu schwerem Knochenumbau im Gleitgebiet und zur Zerstörung der Bandscheibe geführt. Die Bandscheibendegeneration ist bereits so weit fortgeschritten, daß nur mehr eine spaltförmige Aufhellung den verbliebenen Zwischenwirbelraum anzeigt. Diese eindrucksvolle Erscheinung läßt rückwärtschauend einen Schluß zu auf das Zustandekommen einer so beträchtlichen Wirbelbewegung. Der normale Widerstand gegen eine Verschiebung der Wirbelkörper, der durch ihre breitflächige Verwachsung mit dem straffen Fasergewebe garantiert ist, scheint in diesem Falle durch eine abnorme Nachgiebigkeit und frühe Schädigung der Bandscheibe wesentlich gemindert. Dadurch konnte eine so bedeutende Wirbelverschiebung eintreten. Mit dem Verlust der gelenkbildenden und polsternden Zwischenwirbelscheibe haben sich an den benachbarten Wirbelkörpern tiefgreifende Umbauvorgänge abgespielt. Die gegen die Gleitfläche hin zunehmenden Sklerosen, die jede normale Spongiofazezeichnung unterdrücken, veranschaulichen besonders an der hinteren noch belastungsfähigen Hälfte des Gleitwirbels die abnormen Reiz- und Druckverhältnisse. Ihrer Wirkung ist auch die beträchtliche Höhenverminderung am hinteren Gleitwirbelkörper zuzuschreiben. Durch die Abscherbewegung hat sich seine untere hintere Kante abgerundet, sodaß

im Röntgenbild ein leichter Randdefekt zu erkennen ist. Der 1. Kreuzbeinwirbel zeigt vermehrten Kalkgehalt. Eine leichte Schwingung seiner oberen Fläche, die der unteren Lendenwirbelkontur folgt, deutet wie die gleichzeitig bestehenden Sklerosen auf die intensive ungleiche Belastung hin. Ferner weist das Kreuzbein an seiner vorderen Kante zwar geringe Randwulstbildung auf, eine genügende Abstützung gegen das forttschreitende Gleiten durch einen breiten Vorbau oder knöcherne, verbindende Spangen ist nicht erfolgt, sei es, daß die vom Wirbelrutsch ausgehenden Reize zur Knochenkallusbildung zu gering waren oder die Bewegung sich zu rasch vollzogen hat, sodaß eine haltverschaffende Verbreiterung des Fundamentes unterblieb. Das flachgewölbte Kreuzbein scheint in seiner Verlaufseinstellung zur Lendenwirbelsäule etwas aufgerichtet. Seine starke Flächenneigung allerdings hat unter der unbedeutenden Schwenkung keine wesentliche Hebung erfahren. Die Bilder, die ausschließlich bei Rückenlage aufgenommen wurden, lassen leider keine einwandfreien Messungen jener zur Körperfenkrechten bezogenen Winkel zu, wie sie vor Allen Müller und Zwerg am Aufrechtstehenden vorgenommen haben. Während sich an den massiven Wirbelkörpern in der Hauptfache ein weitgehender innerer Umbau vollzogen hat, kennzeichnen hauptsächlich die Veränderungen an den Bogenelementen neben der bedeutenden Verschiebung und der Bandscheibendegeneration diese fortgeschrittene Spondylolisthese. Der mittlere Bogenbereich, der unter der Druckwirkung zu einem dichten bandförmigen Schatten ausgezogen ist, entspricht in keiner Weise mehr den gewohnten normalen Formen. Unmittelbar hinter dem oberen Gelenkfortsatz des Gleitwirbels trennt ein klaffender Spalt quer die Knochenfange, der als eine breite Aufhellung erscheint. Der an ursprünglicher Stelle verbliebene Bogenrest kommt auf die hintere Kreuzbeinkante zu liegen und wird dieser angepreßt. Mit dem Tiefortreten der sich aufbauenden Wirbelsäule, bedingt durch die Höhenabnahme der Bandscheibe und die Abwärtsbewegung auf der schiefen Gleitfläche, drängen sich die benachbarten Bogen und Dorne zusammen und bilden an den Berührungstellen unter der Druckwirkung knorpelige Schliffflächen. Die veränderten statischen Bedingungen prägen sich auch an den Quergelenken aus. Arthritische Randwucherungen führen zur Verbreiterung der Gelenkflächen und zu einer plumpen Verdickung der Gelenkträger. Dieser Abrutsch um mehr als die halbe Wirbelkörperbreite hat zu einer beachtlichen statisch-dynamischen Umlagerung der Wirbelsäule geführt. In einer Geraden, die auch nicht die Andeutung der physiologischen Krümmung im Lendenbrustgebiet erkennen läßt, baut sich die Wirbelsäule stark nach dorsal ausladend auf, indem sie den Oberkörper an seinem freien Ende aufrichtet und so für die tragenden Hüftgelenke ein neues Gleichgewicht herstellt.

Ventro-dorsales Bild. Eine seitliche Abweichung der Wirbelsäule im Sinne einer Skoliose ist nicht festzustellen. An der Lumbo-Sacralgegend fällt sofort eine ungewohnte Schattenbildung auf, die sich aus der Ineinanderzeichnung des olisthetischen 5. Lendenwirbelkörpers und dem Kreuzbein erklärt. Mit auffallend deutlicher Begrenzung zieht dieser massive Schatten, der dem Gleitwirbelkörper entspricht, im halbkreisförmigen Bogen quer durch das Kreuzbeinbild, beginnend von den beiden Proc. Art. sup. des Kreuzbeins, mit dem tiefsten Scheitel reichend

bis zur Höhe des ersten Paares der Foramina sacralia. Der convexe Bogen läuft in zwei Konturen über die Kreuzbeinvorderfläche und stellt die so im Profil getroffene Vorderfläche des 5. Lendenwirbelkörpers dar. Die Basis dieses halbkreisförmigen Schattens läßt in zwei nach schräg oben gerichteten Fortsätzen aus, die nahe an den Darmbeinkamm heranreichen und noch in den Kreuzbeinschatten fallen. In ihnen erkennt man leicht die Form der Querfortsätze des 5. Lendenwirbels wieder. Dieser halbmondförmige Schatten mit den beiden ausladenden Fortsätzen an der Basis wurde von *Mouchet* und *Roederer* mit einem umgekehrten französischen Gendarmenhelm verglichen, dessen Kopfteil den abgerutschten Wirbelkörper und die Krempe die Querfortsätze darstellen. Die Gelenkelemente zeigen auffallend starke fleckige Schatten, die jede Strukturzeichnung vermissen lassen. Die versprengten, wolkigen Aufhellungen können nicht allein von Überfrägnungen der Quergelenke herrühren, sondern sind als fortgeschrittene Umbauermkmale mit Sklerosen und Rarefizierung des Knochens an der I. A. P. aufzufassen. Auffällig erscheint im rechten Zwischengelenkstück eine strichförmige, schräg nach außen von innen oben verlaufende Aufhellungszone, die ihrem Verlauf nach als Bogendefekt zu deuten ist. Schalenförmige Anlagerungen führen hier zur kolbigen Verdickung des Bogens. Der Bogenrest mit Proc. spin. tritt ausgezeichnet im Wirbelkörperbild des L. IV. hervor. Dachfirstartig streben die beiden Bogenbögen zu der vereinigenden Spitze im Proc. spin. zusammen. Dieser hat mit dem Dornfortsatz des L. IV. Gelenkflächen ausgebildet. Der Dornfortsatz ist also mit dem angrenzenden Wirbelstück um ein Beträchtliches hochgezogen, was durch die Winkelbildung zwischen dem abgesprengten Bogen und dem Gleitwirbelkörper ersichtlich ist. Bemerkenswert ist schließlich die Stellung der schräg nach oben gerichteten Querfortsätze der beiden letzten Lendenwirbel. Als Nebenbefund zeigt sich ein am ersten Lendenwirbel ansetzendes Lendenrippenpaar. Im Becken besteht eine Arthrosis sacroiliaca, die sich durch Randklofen und Zacken kennzeichnet. Die Spina iliaca ist durch den vermehrten Zug des Lig. iliolumbale ausgefaset.

Röntgenbefunde, wie wir sie im vorliegenden Falle beobachteten, kehren bei fortgeschrittenem Wirbelgleiten häufig wieder, wenn keine andere Aufbauförderung der Wirbelsäule die Entwicklung eines solchen pathologischen Zustandbildes wesentlich beeinflußt. Eines jedoch scheint mir wieder für die Art der sekundären Veränderungen nicht gleichgültig. Wie der Flächenneigungswinkel des Kreuzbeins den Fortgang und das rasche Fortschreiten der Wirbelverschiebung wesentlich bestimmt, so ist für die Art des Zustandekommens der sekundären Umbildungen entscheidend, ob die Degeneration der Bandscheibe gleichmäßig in ihrer ganzen Ausdehnung unter dem Verlust ihrer keilförmigen Gestalt erfolgt, oder durch den ungleichen Druck und Zug vornehmlich nur ihren dorsalen Teil betrifft und dadurch eine vermehrte Keilform mit einem stark nach vorne offenen Winkel entsteht. Diese richtet den Gleitwirbel auf und verhindert so die sekundären Abknickungen im Bogen. Um also die Verhältnisse im weitesten Sinne zu erfassen, zieht jede Änderung des Lumbo-Sacralwinkels, wie sie in erster Linie durch den Verlust der keilförmigen Gestalt der Bandscheibe hervorgerufen

wird, Veränderungen vor allem im Bogenbereich nach sich, die sich als dessen unmittelbare Folge kundtun.

Ein Zusammenfinken des Zwischenwirbelaumes auf einen bandförmigen Spalt, wie in dem eben beschriebenen Fall, war bei weiteren 3 Patienten festzustellen. Sie boten in der Röntgenaufnahme dieselben Erscheinungen des Gleitens. Der ganzen Betrachtung sind die seitlichen Bilder zugrunde gelegt.

Sch., I. und B. Es besteht eine beträchtliche Verschiebung des 5. Lendenwirbels gegen das Kreuzbein. Ein breiter Defekt trennt den hinteren Bogen und Dorn von der Bogenwurzel. Als besonders schwere Störung fällt die Degeneration der Bandscheibe auf, sodaß nur mehr ein spaltförmiger Raum die beiden Wirbelkörper trennt. Gerade dieses Zusammenfinken der Zwischenwirbelscheibe, der keine aufrichtende Bedeutung mehr zukommt, verursacht Veränderungen am Bogen des Gleitwirbels, die als unmittelbare und typische Folgen des Verlustes der vorderen Bandscheibenhöhe sich ausprägen. Während der auf dem Rücken des Kreuzbeins reitende und durch die gelenkige Bindung fixierte hintere Bogen zu keiner wesentlichen Veränderung seiner Lage befähigt ist, führt in diesen Fällen der losgelöste Gleitwirbel außer der Vorwärtsbewegung eine Drehung seiner sagittalen Achse aus, die der Abnahme der vorderen Zwischenwirbelaumhöhe entspricht. Dadurch entsteht eine abnorme Winkelbildung an der Durchtrennungsstelle des Bogens, eine Abknickung, die als ausgesprochenes Merkmal für diese Form des Wirbelgleitens gelten mag. Es ist leicht einzusehen, daß die Wirbelsäule, die sich erst mit dem nächst höheren Wirbelkörper und seiner Bandscheibe an der Lumbo-Sacralgrenze aufrichtet, den Bogen unter ganz andere Bedingungen stellt, als wenn die Keilform der letzten Lendenbandscheibe erhalten ist. Die der Gleitebene nahen Dorne erscheinen in all den Bildern stark genähert und kommen zum Teil in breit ausgebildeten Schlifflächen in gelenkige Verbindung. Ausgedehnte Sklerosen und Deformierungen verleihen hauptsächlich den hinteren Bogenschenkeln, aber auch den Quergelenkträgern, ein ungewohntes Aussehen. Dieser Knochenumbau, der sich natürlich auch bei der folgenden anderen Form des fortgeschrittenen Gleitens vollzieht, erfährt lediglich durch diese abnorme Winkelbildung an der I. A. P. eine besondere Betonung. Beträgt diese doch, gemessen an der Bogendornachse zur sagittalen Achse des Gleitwirbelkörpers in den 4 beobachteten Fällen: Schw. 115° , Schm. 125° , B. 120° , I. 135° , während der normale Winkel zwischen hinterem Bogen und Bogenwurzel 150° bis 160° beträgt. Anders verhalten sich die sekundären Bogenveränderungen bei folgenden 2 Patienten.

H. und K. Die Wirbelbewegung ist ähnlich weit fortgeschritten. Der Zwischenwirbelraum aber weist eine nach vorne offene Keilform von 23° bzw. 21° auf, Werte die den normalen Bandscheibenwinkel von 15° beträchtlich übertreffen. Die hintere Gleitwirbelkante hat sich in das Bandscheibenpolster hineingefenkt, sodaß sie in beiden Fällen die Kreuzbeinfläche beinahe erreicht, während ventral der Fasernorpel sich als ein mächtiger Keil aufrichtend zwischen Gleitwirbel und der verbreiterten Kreuzbeinfläche gegen die sich senkenden Wirbelkörper hineintreibt. Wohl tritt durch die Abwärtsbewegung auf der schiefen Gleitfläche die gesamte Wirbelkörperreihe tiefer, sodaß auch auf diesen Bildern der Dornfort-

satz und Bogen des Gleitwirbels dem Kreuzbein aufgepreßt wird und entsprechende Druckfklerosen aufweist. Trotz der Bogenunterbrechung beobachten wir hier aber keine so ausgesprochene Abknickung am Zwischengelenkstück, da eine Änderung der Einstellung des Gleitwirbels zu dem verbliebenen Bogenrest, durch die Widerstandsfähigkeit des vorderen Teiles der Bandscheibe verhindert wurde. So kam es in diesen beiden fortgeschrittenen Fällen zu einer dem Normalen entsprechenden Winklereinstellung von 145° bzw. 145° an der I. A. P. Verfehlt wäre es, wollten wir für die Abwinkelung, die in diesen Beobachtungen zu eindeutigen Ergebnissen geführt hat, ausschließlich die Wirbelkörperpfeilung als Folge einer bestimmten Bandscheibendegeneration, verantwortlich machen. Gibt es doch außerdem noch andere Möglichkeiten der Winkeländerung, die in der Aufrichtung des Kreuzbeins bestehen oder in einer Schwenkung des Gleitwirbeldornes durch den Zug der ihn einschließenden Bänder. Eine sichere Entscheidung, inwieweit für eine solche Einstellungsänderung diese einzelnen Kräfterichtungen, ja schließlich auch die Kreuzbeinform als solche mitbestimmend sind, kann nur aus dem gesamten Verhalten der Druck- und Bewegungsmöglichkeiten im Gleitgebiet gefällt werden.

Bogenveränderungen dieser Art begegnen wir bei fortgeschrittener Spondylolisthese so gut wie immer. In einzelnen schweren Fällen beobachten wir aber auch ausgedehnte Formveränderungen des Gleitwirbelkörpers und des massiven Kreuzbeinfundamentes, die sich unter dem Einfluß des Gleitens neben einem weitgehenden inneren Knochenumbau entwickelt haben.

Das Röntgenbild des Patienten B. zeigt zwar eine Spondylolisthese def., die in exostosenartigen Zacken, in Einbrüchen der Bandscheibe in die Wirbelkörper und in einer allgemeinen Verbildung der einzelnen Wirbelelemente zum Ausdruck kommt. Neben dieser Allgemeinerkrankung aber besteht gleichzeitig eine schwere Spondylolisthese des L. V., die zu bedeutenden Deformierungen am ganzen Gleitwirbel und seiner Unterlage Veranlassung gab. Die Schwere der Veränderungen erklärt sich aus der gesamten Dispositionslage der Wirbelsäule gegen physiologische, wie krankhafte Reize mit schwersten Prozessen am Knochenstützapparat zu reagieren. Die Spondylolisthese war daher in besonderem Maße befähigt, ein drucksvolle Befunde zu entwickeln. Wir finden im seitlichen Röntgenbild alle die besprochenen Veränderungen des fortgeschrittenen Wirbelrutsches wieder, die sich durch eine völlige Zerstörung der Bandscheibe an den Bogenelementen einstellen. Der Schatten des Gleitwirbels hat seine normale Trapezform verloren. Außer einer bedeutenden Verschmälерung der dorsalen Hälfte, bemerken wir an der Wirbelgrundfläche Vertiefungen, sodaß ihre Begrenzung im Profil einer kurzbogigen S-Krümmung entspricht, die mit ihrem convexen Scheitel weit in den reaktionslosen Kreuzbeinfockel eindringt. Lediglich die abgerundete hintere Kante des Gleitwirbels zeigt unter der Druckwirkung eine leichte Verdichtung. Diese Kante hat an der oberen Kreuzbeinfläche eine schüsselförmige Höhlung durch sichernde Bewegungen und den Belastungsdruck geschaffen. Eine wulstartige Randverdickung und Ausziehung der vorderen Kreuzbeinkante verbreitert das stützende Fundament des nach vorne verschobenen Gleitwirbels. Von diesem gehen gleichsam als haltende Zügel dichte, schattengebende Stränge zur hinteren

Kreuzbeinkante. Durch all diese Veränderungen hat sowohl der Gleitwirbel, als auch das Kreuzbein eine schwere Deformierung erfahren.

In einigen Fällen echter Spondylolisthese tritt eine Verschiebung des 4. Lendenwirbelkörpers auf dem L. V. ein. *Junghanns* fand bei seinen pathol. anat. Untersuchungen diese Lokalisation des Wirbelrutes bei $\frac{1}{3}$ sämtlicher Gleitwirbelkranker, in einer Häufigkeit also, die sich mit den klinischen Beobachtungen nicht völlig deckt. Denn die Wirbelbewegung des L. IV. erreicht selten so hohe Grade und kommt daher wegen der geringeren Beschwerden nicht so oft zur klinischen Beobachtung. Immerhin fanden sich unter 24 Gleitwirbelkranken 4 Patienten mit einer Spondylolisthese des 4. Lendenwirbelkörpers. Im Wesentlichen begegnen wir bei diesen Fällen ähnlichen Veränderungen im Röntgenbild, wie wir sie schon bei früheren Befunden antreffen konnten. Der Bogen des Gleitwirbels weist im Zwischengelenkstück ebenfalls eine Unterbrechung auf, die auch hier als besonderes Merkmal der echten Spondylolisthese gilt. Die sekundären Veränderungen, kurz die Gleitspuren, gleichen ebenfalls jenen, die wir beim Gleiten des L. V. auf dem Kreuzbein beobachtet haben. Verdichtungen der Wirbelkörperpongiosa, Randzackenbildungen an den Quergelenken und eine Verschmälerung der Bandscheibe wurden durch die Verschiebung bewirkt. Ebenso läßt sich der Grad der Vorwärtsbewegung des Wirbels an der Ausziehung seines Bogens sowohl, als auch an der Einstufung am unteren Lendenwirbel erkennen. Diese Merkmale decken sich also mit dem Zustandsbild des Gleitens an typischer Stelle. Freilich, wollten wir eben die Überlegungen pflegen, die sich auf die Dynamik des Zustandekommens der Verschiebung beziehen, so würden wir in jedem einzelnen Falle andere Bedingungen finden.

R. H. Bemerkenswerte Einzelheiten ergeben sich bei der Betrachtung der Röntgenbilder zweier Patienten mit Gleiten des 4. Lendenwirbels. Die seitliche Aufnahme zeigt die Verschiebung deutlich. Wie schon erwähnt, ist diese auch hier nicht sehr erheblich, sodaß sie bei dem Patienten R. $\frac{1}{4}$ der Wirbelkörperbreite nicht überschreitet. Eine beträchtliche Verschmälerung der Bandscheibe mit strangförmigen Verdichtungen und ein breiter Bogendefekt treten als wesentliche morphologische Veränderungen hervor. Ferner deuten eine Verbreiterung der Quergelenkflächen durch Randwucherungen, Sklerosen an den Gelenkträgern, wie am Bogen abnorme Druckverteilung hin. An keinem der beiden Bilder ist eine deutliche Bogenknickung an der I. A. P. festzustellen, ein Hinweis auf die wesentlich leichtere Form der sekundären Umbildungen. Es ist ja wohl zu beachten, daß die Gleitebene am Kreuzbein keineswegs mit der zwischen L. V. und L. IV. gleichzustellen ist. Während im ersten Falle ein viel kleinerer Flächenneigungswinkel gefunden wird, der frühzeitig den Gleitwirbel zu einer Schwenkung seiner sagittalen Achse veranlaßt, ist die Gleitfläche des IV. Lendenwirbels bereits durch die Keilform der präfacralen Bandscheibe und des L. V. bedeutend weniger geneigt. Ein weiterer Grund für die geringeren sekundären Schädigungen beim Gleiten des 4. Lendenwirbels liegt darin, daß die Wirbelkörperachsen des L. IV. und L. V. einen flacheren Winkel bilden, als die des L. V. zum S. I. im Lumbosacralwinkel. So betragen bei dem Patienten R. der Lumbosacralwinkel 137° , der Achsenwinkel des L. V. zu L. IV. 160° , bei dem Patienten H. der

Lumbosacralwinkel 140° , der Achsenwinkel des L. V./ zu L. IV. 165° . Die Bogenveränderungen am gleitenden V. Lendenwirbel haben die Bedeutung des kleinen Lumbosacralwinkels deutlich erkennen lassen. Beim Gleiten des IV. Lendenwirbels beobachten wir infolge des flacheren Achsenwinkels wohl eine typische Elongation des Bogens und sehen die Dorne durch die Abnahme der Bandscheibenhöhe im Gleitgebiet einander genähert. Druckpunkte aber an den Proc. spin., die durch Sklerosierung und Bildung von Gelenkflächen sich kennzeichnen würden, sind ebenso wie eine Abknickung des Bogens, wenigstens in diesen Fällen, nicht zu finden. Kurz, es steht also beim Gleiten des IV. Lendenwirbels mehr die Verschiebung im Vordergrund, während sekundäre Veränderungen wohl als Gleitfiguren im engsten Sinne entstanden sind, ohne aber das schwere Bild, das dem fortgeschrittenen Gleiten auf dem Sacrum eigentümlich ist, zu entwickeln; denn durch den offenen Wirbelachsenwinkel des L. IV. und L. V. unterbleibt an der Gleitebene eine Druckwirkung von Seiten der benachbarten Bogen und Dorne.

Pat. H. Zu besonderen Betrachtungen über das Bestehen der Spondylolisthese des 4. Lendenwirbels gibt die im *dorso.-ant.*-Röntgenbild erscheinende Skoliose Anlaß. In einem stark convexen Bogen läßt die Lendenwirbelsäule nach links aus, während gleichzeitig die einzelnen Wirbel eine Linksrotation vollzogen haben. Vom 4. Lendenwirbel ab kommt daher die Lendenwirbelsäule in einer ganz besonders schönen Schrägaufnahme zur Darstellung. Mit einer selten beobachteten Deutlichkeit treten die Bogenelemente hervor, die bekannte Schmetterlingsform bildend. Die Quergelenke, die dachziegelförmig sich übereinanderordnen, werden in ihrem feinsten Bau sichtbar. Dornfortsatz und Querfortsatz sind im Profil gut zu erkennen. Ferner stellt sich das Zwischengelenkstück in feiner Form und Struktur einwandfrei dar. Diese Wirbeldrehung, die gerade mit dem Gleitwirbel einzusetzen scheint, ließ an eine prinzipiell andere Art des Entstehens des Wirbelrutschs in diesem Falle denken. Es galt jene, nicht seltene, besonders bei schwerer Spondylarthrosis und Skoliose beobachteten Form der Wirbelschiebung, das Drehgleiten auszuschließen. Das Drehgleiten vollzieht sich im Gegenfatz zur echten Spondylolisthese ausschließlich bei intaktem Wirbelbogen und kommt nur durch eine Bänderlockerung an den Quergelenken gleichzeitig unter der Nachgiebigkeit einer veränderten Bandscheibe zustande. Hier aber finden wir deutliche Zeichen des echten Wirbelgleitens am Bogen, die in einer nur wünschenswerten Klarheit erscheinen. Ein Vergleich mit den übrigen Wirbelbögen ergibt sofort die Störung am Zwischengelenkstück des Gleitwirbels. Ein glattrandiger Defekt senkt sich zwischen die beiden Gelenkfortsätze und trennt so den Proc. art. inf. von der Bogenwurzel. Der obere Gelenkfortsatz des L. IV zeigt nicht den feinen kantigen Bau der übrigen, sondern erhält durch Randanlagerungen um die Gelenkfläche ein plumperes Aussehen. Die Beziehungen des Gleitwirbels zum L. V sind nicht klar zu deuten, jedoch ist eine seitliche Verschiebung gegen seine Unterlage in der Richtung der skoliotischen Ausbiegung zu erkennen. Die Zusammenhänge der Bewegung des von seiner Verankerung gelösten Wirbels mit den nach der gleichen Seite wirkenden Kräften der Skoliose, liegen auf der Hand.

Patient H. Es wurde wiederholt die Frage erörtert, weshalb in selteneren

Fällen die Wirbelverschiebung sich nicht auf dem Kreuzbein vollzieht, sondern auf einem höheren Wirbel, dem L. V eintritt. Ein allgemein zutreffender Grund kann bei der Annahme eines von Anfang an bestehenden Defektes an der I. A. P. ebenfowenig angegeben werden, wie für die typische Spondylolisthesis etwa ein kleiner Lumbosacralwinkel oder der Flächenneigungswinkel des Kreuzbeins bestimmend ist. Für den einen Fall des Gleitens auf dem L. V. findet der „hohe Wirbelrutsch“ keine Erklärung in der knöchernen Verbindung des letzten Lendenwirbels mit dem Kreuzbein, die durch eine Fehlbildung am Bogen, der bekannten Sacralisation, zustandegekommen ist. Der präfacrale Wirbel bildet zwar mit dem Kreuzbein keine knöcherne Einheit, sein Halt ist aber unvergleichlich fester als die gelenkige Verbindung der übrigen Lendenwirbel.

Die Angleichung eines Wirbels an den nächsten Wirbelsäulenabschnitt, ein sogenannter Übergangswirbel, findet sich häufig und läßt in einem kleinen Bildausschnitt eine eindeutige Bestimmung seiner Zugehörigkeit nur selten zu.

Patient M. Die seitliche Röntgenaufnahme zwingt ebenfalls zur Annahme eines Übergangswirbels und zwar, wie es auf den ersten Blick scheint, eines sacralisierten V. Lumbawirbels. Die genauere Betrachtung aber läßt über die Art des Übergangswirbels Zweifel entstehen. Eine Abzählung der Lendenwirbel ergibt nämlich, soweit sich aus dem sichtbaren Verlauf des letzten Rippenpaares ersehen läßt, daß der präfacrale Übergangswirbel als ein lumbalisierter Sacralwirbel betrachtet werden muß. Für die sekundären Umbildungen der echten Spondylolisthese scheint mir die Frage von viel geringerer Bedeutung zu sein, ob ein 4. Lendenwirbel, oder ein 5. Lendenwirbel bei lumbalisiertem ersten Sacralwirbel ins Gleiten gerät, als die Tatsache, *daß der Wirbelrutsch sich auf einem freien, durch eine aktiv aufrichtende Bandscheibe gehobenen Wirbel abspielt.* Solche Wirbelverschiebungen können wegen der Ähnlichkeit der durch die Spondylolisthese entstandenen Veränderungen allgemein unter dem Begriff des „*hohen Gleitens*“ zusammengefaßt werden.

So weist auch in diesem Fall der Gleitwirbel trotz seiner beträchtlichen Verschiebung um $1\frac{1}{2}$ cm und der zugleich bestehenden Spondylarthrosis def. wohl die typischen Gleitsymptome auf, schwere deformierende Prozesse am Bogen und Knickungen in seinem Verlaufe fehlen jedoch. Der Bandscheibenraum ist bedeutend zusammengefunken und seine begrenzenden Wirbelkörperflächen zeigen stark schattengebende reaktive Kalkeinlagerungen. Die Verschiebung ist fast in der Waagrechten erfolgt, da die Gleitebene durch die aufrichtende Eigenschaft der unter dem Übergangswirbel gelegenen Bandscheibe und die Keilform dieses Wirbels nur wenig geneigt ist. Dieser Umstand kommt vor Allem an den Bogenveränderungen zur Geltung. Durch die Bandscheibendegeneration haben sich die benachbarten Dorne genähert und sind zur Berührung gekommen. Trotz des breiten Defektes im Zwischengelenkstück des Gleitwirbels ist eine Abknickung des Bogens an dieser Stelle nicht erfolgt. Die Quergelenke zeigen wohl unter der allgemeinen Spondylarthrosis Randwucherungen und Zacken, die den Gelenkspalt kaum mehr erkennen lassen.

Sahen wir im „hohen Gleiten“ eine nicht häufige Lokalisation des Wirbelschiefes, so ist die echte Spondylolisthesis eines 6. Übergangswirbels nur selten beobachtet worden.

Mö. Das dorso-ant. Röntgenbild läßt den letzten Brustwirbel mit dem ansetzenden Rippenpaar deutlich erkennen. Die Zahl der freien Lendenwirbelkörper beträgt wider Erwarten 6. Eine Eingliederung des überzähligen Wirbels ist hier trotz der guten a.-p. und seitlichen Aufnahme unmöglich. Die Entscheidung für einen lumbalisierten Sacralwirbel oder einen echten Schaltwirbel würde bei der röntgenologisch normalen Kreuzbeinform stets unsicher und anfechtbar sein, trotzdem die Grenze zwischen Brust- und Lendenwirbelsäule durch den Ansatz des letzten Rippenpaares angegeben werden kann. Dieser praesacrale Schaltwirbel läßt die Merkmale der echten Spondylolisthesis in ausgezeichneter Weise erkennen. Am rechten Bogen ist die Unterbrechung des Zwischengelenkstückes deutlich sichtbar. Eine breite Auftreibung mit dichter Schattenzeichnung, durchsetzt mit wolkenigen Aufhellungen, kennzeichnet die Störung an den seitlichen Bogenpartien. Bei der allgemeinen Porose der Wirbelkörper heben sich die stark schattengebenden Sklerosen im Bogen und Dorn des Gleitwirbels eindrucksvoll ab. Der Gleitwirbelkörper mit den Querfortsätzen projiziert sich in den Kreuzbeinschatten und bildet die bekannte Figur des umgekehrten Zweispitzes. Die Querfortsätze streben scharf nach oben. Eine erhebliche Arthrosis sacroiliaca vervollständigt das allgemeine Bild der Wirbelschiebung in der dorso.-ant. Strahlenrichtung.

Die seitliche Aufnahme weist vollends die Zeichen der fortgeschrittenen Spondylolisthese auf. Über die halbe Wirbelkörperbreite hat sich der Gleitwirbel nach Vorne verschoben, ja sich sogar zur Clisis angeschickt. Die Bandscheibe ist nahezu vollkommen zerstört. Der Bogen des Gleitwirbels zeigt eine winkelige Knickung an der I. A. P., nachdem der Wirbelkörper eine Schwenkung seiner sagittalen Achse durch das Tiefertreten seiner vorderen Kante vollführt hat. Eine Impressionsfurur des Wirbelkörpers in seinem mittleren Drittel und die Höhenverminderung im dorsalen Teil beeinträchtigen das normale Formbild des letzten praesacralen Wirbels.

Beachtenswert ist in diesem Falle die Gesamthaltung der Wirbelsäule. Das Kreuzbein erscheint mit dem ganzen Beckengürtel aufgerichtet, eine Maßnahme des Körpers, die durch das Gleiten entstandene Gewichtsverschiebung auszugleichen. Durch die Aufrichtung des Beckens gelangen in erster Linie die tragenden Hüftgelenke nach Vorne und rücken damit in die nach Vorne verschobene Körperschwerlinie. So wird ein neuer Gewichtsausgleich der auf dem Oberschenkelkopf ruhenden Körperlast erreicht. Anschließend an das steil aufgerichtete Kreuzbein beschreibt die Lendenwirbelsäule durch die beträchtliche Verschiebung und die beginnende Clisis seines Basiswirbels einen stark gegen die Beckenmitte vorspringenden Bogen, um dann gegen dorsal auszuladen, ohne aber in die Lenden-Brustkyphose überzuführen. Diese kurzbobige tiefe Lendenlordose bedingt ein Zusammenrücken der Dorne, die durch ihre breitflächige Berührung die tragende Funktion der Wirbelkörper zum Teil übernehmen, da nur mehr Bogen und Dorn eine stützende Unterlage am Kreuzbein finden, während die Wirbelkörperreihe durch die starke Verlagerung nur in ihrem hinteren Abschnitte gering belastungs-

fähig ist. Stark schattengebende Sklerosen, vor allem im Bereich der Quergelenke und in den Bögen, aber auch an den Dornen deuten auf die abnormen Belastungsreize hin. Die schwere Spondylolisthese eines 6. praefacralen Übergangswirbels zeigt ebenso wie der Wirbelrutsch des L. V die typischen Gleitveränderungen und entspricht auch in ihren Folgen auf die statisch-dynamischen Umlagerungen der gesamten Wirbelsäule dem charakteristischen Krankheitsbild des praefacralen Wirbelrutsches.

Eine besondere Art des Gleitens eines praefacralen Wirbels auf Grund angeborener Defektbildung im Bogen zeigt die Aufnahme des Patienten L.

Das seitliche Bild der Lumbo-facralgegend läßt eine geringe Verschiebung des L. V auf dem Kreuzbein erkennen. Der Bandscheibenraum ist erhalten. Außer den bekannten, nicht sehr ausgeprägten Gleitspuren, interessiert vor Allem der Bogen. Zwei strichförmige Aufhellungszonen mit angrenzenden bandförmigen Verdichtungen durchsetzen quer die Bogenspanne, die eine dicht hinter den Proc. art. sup., die andere unmittelbar an der Dornwurzel, also sehr weit dorsal. Eine Abknickung der Bogendornachse, die eine Unterbrechung vermuten ließe, ist nicht erfolgt, dagegen ist eine Ausziehung des Bogens festzustellen. Eine Erklärung dieser besonderen Merkmale am Bogen gibt das dorso.-ant. Bild. Die Wirbelkörper, mit Ausnahme des L. V, erscheinen deutlich in der Aufnahme. Auffallend sind die stark kranial gerichteten Querfortsätze des L. IV und L. V. Im Gegensatz zu dem in seiner Begrenzung nur angedeuteten Gleitwirbelkörper, tritt der Bogen in klarer Zeichnung hervor. Von den Bogenwurzeln weist vornehmlich nur die linke Umbauprozesse, die einen Spalt an der I. A. P. vermuten lassen, auf. An der rechten Bogenwurzel hingegen ist wohl ein Verdichtungsschatten, jedoch keine augenscheinliche Verbreiterung des Knochenschattens mit unregelmäßiger, wolkiger Zeichnung festzustellen. Dicht am Übergang zum Dorn findet sich aber im rechten Bogen eine Defektbildung, die denselben an ungewöhnlicher Stelle trennt. Wir müssen also annehmen, daß die Bogendurchtrennung anfangs wohl nur einseitig links bestanden hat und die Unterbrechung an der Dornwurzel rechts sich als ein Bieungsbruch durch die einsetzende Wirbelbewegung gebildet hat. Die endgültige Bogenlösung ist daher nicht durch einen symmetrischen Defekt am Zwischengelenkstück erfolgt, Beobachtungen, wie sie auch von Kilian, Neugebauer und Lambl beschrieben worden sind.

Als Nebebefund schwerer angeborener Fehlbildungen konnten wir eine Wirbelverschiebung an der Lumbo-facralgrenze bei dem Patienten E. beobachten. Aus der seitlichen Aufnahme geht die Verschiebung des praefacralen Wirbels klar hervor. Der Bandscheibenraum erscheint wohl angedeutet und ist im Vergleich zu den oberen von einem dichteren Schatten ausgefüllt, der eine scharfe Abgrenzung gegen das Kreuzbein unmöglich macht. Das Kreuzbein ist stark aufgerichtet und zeigt eine nur sehr flache Wölbung. Ein Bogendefekt des Gleitwirbels ist im seitlichen Bild nicht zu erkennen. Sklerosen gegen die Gelenke und die Bandscheiben mit geringen Randzacken beherrschen das Gleitgebiet. Die Frontalaufnahme ergibt vollends einen überraschenden Befund. Hüftgelenke und Beckenkreuzbeingürtel zeigen normale Verhältnisse. An der Sacro-lumbalgrenze aber stellen sich schwerste Veränderungen heraus, die die Lendenwirbelsäule in

eine scharfe Linkskoliose zwingen. Ein verwirrendes Bild geben die bedeutenden Störungen, die den ersten Kreuzbeinwirbelkörper mit dem letzten Lendenwirbel in ihren rechten Hälften durch eine Fehlbildung zu einem soliden, knöchernen Block verschmelzen. In seiner linken Hälfte hingegen hat sich der 1. Kreuzbeinwirbel von dem knöchernen Verband des Sacralwirbels II befreit und mit der entsprechenden freien Hälfte des L. V eine gelenkige Verbindung aufgenommen. Es besteht demnach eine Sacralifation der linken Lendenwirbelhälfte und eine rechtsseitige Lumbalifation der ersten Sacralwirbelhälfte. Zugleich weist das Kreuzbein eine offene mediale Bogenpalte auf. Der linke Querfortsatz des L. V. steht als breiter Knochenflügel mit dem 1. Sacralwirbel in Verbindung, während an der rechten Seite der lumbalisierte 1. Kreuzbeinwirbel und der letzte Lendenwirbel freie schmale Querfortsätze aufweisen. Einem halben angelegten Bogen des 5. Lendenwirbels entsprechend, springt von rechts außen gegen medial eine Knochenspange vor, die hier frei endigt. Die Verschiebung des L. V, die im seitlichen Röntgenbild als eine echte Spondylolisthese imponiert, kann nach diesem Befund der halbseitigen knöchernen Verbindung des L. V mit S. I nur als eine von Anfang an bestehende Dislokation gedeutet werden.

Nach der Bearbeitung des großen Röntgenmaterials, das mir an der orthopädischen Universitätsklinik München zur Verfügung stand, kann abschließend gesagt werden, daß schleichende Wirbelveränderungen auch im Lendenkreuzbein-gebiet in einem guten Röntgenbilde wohl erfaßt und auch entsprechend analysiert werden können. Es muß aber wiederum darauf hingewiesen werden, daß es gilt, für die Diagnose einer Spondylolisthese in allen Fällen den Zwischengelenksdefekt nachzuweisen. So müssen streng genommen die beiden letzterwähnten Fälle trotz der vielen Ähnlichkeiten mit dem echten Gleiten aus der Betrachtung ausscheiden, weil wir an ihnen die charakteristische Unterbrechung der Bogenfchenkel an typischer Stelle vermissen.

Gerade über die Entstehung dieses Zwischengelenksdefektes am Bogen des Gleitwirbels gehen heute die Meinungen noch weit auseinander und dies um so mehr, als durch röntgenologische Beobachtungen am Lebenden neue Überlegungen angestellt und Erfahrungen gesammelt werden konnten. Ist es doch gelungen, durch gezielte stereoskopische Spezialaufnahmen den verhältnismäßig grazilen Bogen in diesem versteckten Winkel einwandfrei darzustellen und ihn der streuenden Einflüsse des massiven Wirbelkörpers zu entziehen.

Eine besondere Vollendung in der Darstellung zeigen die Aufnahmen Meyer-Burgdorffs in seiner Monographie über das Wirbelgleiten und die erschienenen Bilder Warners aus dem Krankenhaus Bergmannsheil in Bochum. Zuweit allerdings dürfte Meyer in seiner Monographie gegangen sein, wenn er an Hand seiner hervorragenden Bilder über pathologisch-anatomische Vorgänge in der Interartikularportion des Gleitwirbels Theorien und Erwägungen aufstellt, die schließlich nur dem mikroskopisch Beobachtenden pathologischen Anatomen kund werden können. Wohl gelingt es, eine schleichende Fraktur von einer traumatischen auch an dieser Stelle zu unterscheiden, doch eine ursächliche Deutung einer langsam sich vollziehenden Rarefizierung dieses schmalen Knochenstückchens bleibt wohl dem Pathologen vorbehalten. Sehr bestechend für den Augenblick sind zwar

die Darlegungen Meyers, in denen er für die Entstehung des Defektes eine dauernde Überbeanspruchung der I. A. P. durch statische Druckwirkungen vor allem bei einer bestehenden Lendendorlofe geltend macht. Seine Ansichten werden aber heute von vielen Seiten angegriffen, zumal viele Voraussetzungen seiner Beweisführung als unzutreffend bezeichnet werden müssen.

So kann z. B. nicht die konditionelle Lordose auf alle Fälle ausgedehnt werden. Sie soll später in die bekannte Stellung der Spondylolisthetikranken, denen die geringe Beckenneigung und die flachbogige Wirbelfäule geradezu eigen ist, übergehen? Auch der Begriff der Zange, zwischen der der Bogen des Gleitwirbels abgedrückt werden soll kann aus rein anatomischen Gründen nicht in seiner vollen Bedeutung aufrechterhalten werden, da die benachbarten Gelenkfortsätze des L. IV und ersten Kreuzbeinwirbels in einer starken Winkelstellung zueinanderstehen. Auch treffen sich die angenommenen beiden kneifenden Zangenblätter nicht in einer schneidenden Ebene.

Fast allgemein hat man heute auch jene Annahme fallen lassen, nach der traumatische Einflüsse als auslösend für die Unterbrechung im Zwischengelenkstück angesehen wurden. Für sie traten hauptsächlich Jaroschy, Albee, Scherb, Joisten und andere ein. Für einzelne Fälle wird sie auch jetzt noch von den Engländern und Amerikanern als zutreffend anerkannt, da besonders bei Arbeitern in den Kohlenbergwerken dieses Leiden auffallend häufig beobachtet wird.

Sehr weit von dem wirklichen Wesen der Krankheit entfernen sich aber jene Autoren, die ein einmaliges Trauma, das im Sinne einer Fraktur die Lösung des hinteren Bogens an symmetrischer Stelle verursachen sollte, als Ursache der Spondylolisthese bezeichnen. Diese Ansicht wird vertreten von Lovelt, Maxwell, Wilhelm, Kleinberg, Michael, Desfosses, Asbury, Ach, Novak, Hayek, Hellner u. a.

Die Fälle aber von Schulz, Brandenburg, Mouchet Roederer und Wynen weisen in ihrer Krankengeschichte kein Trauma auf, das für die Entstehung einer angeblichen Fraktur im Zwischengelenkstück verantwortlich gemacht werden könnte. Mit Recht lehnt Huber den Begriff einer traumatisch entstandenen Spondylolisthese ab, weil sich im Röntgenbild die Zeichen einer frischen Fraktur in keinem Falle nachweisen ließen. Mit ihm stellte Jaroschy als Wesen der Spondylolisthese einen langsamen schleichenden Verlauf zur Forderung.

Fast allgemein kehrt man in der deutschen Literatur wieder zurück zu der von Neugebauer so überzeugend dargelegten Annahme, daß wir in der Spondylolisthese ein angeborenes Leiden zu erblicken haben. Eindeutige Beweise dafür hat Schmorl in seiner letzten Veröffentlichung und mit ihm sein Schüler Jungmanns an Hand mikroskopischer Präparate gebracht. Neugebauer und mit ihm Schmorl führen den Spalt auf eine angeborene Anomalie, auf eine persistierende Knorpelfuge zwischen den beiden Gelenkfortsätzen zurück. Schmorl hat bei zwei Kindern im Alter von 2 und 2½ Jahren Spaltbildungen wie sie der Spondylolyse entsprechen, beschrieben. An einem mikroskopischen Schnitt zeigt sich an der Stelle des Zwischengelenkdefektes eine rudimentäre Knorpelfuge mit präparatorischen Verkalkungszonen an den gelösten Bogenenden und der Bogenwurzel. Doppelseitige Spalten, ohne daß irgendwelche Veränderungen vorlagen, die auf Umbau vorgänge im Sinne Meyer-Burgdorffs hätten schließen lassen, konnte

Schmorl auch bei 15-, 18- und 22-Jährigen finden. Es gilt demnach für erwiesen, trotz vieler anderer Erklärungsversuche, über die sich bereits eine ganze Literatur angehäuft hat, daß jener Defekt an der Interartikularportion des Gleitwirbels auf eine erhalten gebliebene Knorpelfuge zurückzuführen ist.

Inhaltsübersicht:

A)

- I. Wirbelverschiebungen als Ausdruck (Symptom) verschiedener Erkrankungsformen der Wirbelfäule und ihre Erscheinungen im Röntgenbild.
- II. Die pathologisch-anatomischen Verhältnisse bei der Spondylolisthese.

B) Die röntgenologische Darstellung:

- I. Fälle beginnender Spondylolisthese.
- II. Fortgeschrittenes Gleiten des 5. Lendenwirbels.
- III. Hohes Gleiten.
- IV. Gleiten eines Schaltwirbels (L. VI).
- V. Grenzfälle.

C) Zusammenfassung:

- I. Zwischengelenksdefekt als unumstößliche Forderung für die Diagnose einer Spondylolisthese.
- II. Theorien und Tatsachen über die Art der Entstehung der symmetrischen Defektbildung an der I. A. P. des Gleitwirbels.
 - a) Mayer Burgdorffs: Schleichende Fraktur.
 - b) Trauma als auslösendes Moment für die Entstehung der Bogenfalte.
 - c) Wirbelbogenfraktur als Ursache der Spondylolisthese.
 - d) Neugebauer's Theorie und Tatsachenberichte Schmorl's und seines Schülers Junghanns.

Literaturangabe:

- Ach, Spondylolisthesis, Arch. klin. Chir. 163 (1931)
- Anderßen, Über Anomalien des Wirbels und der Rippen, Fortschr. Röntgenstr. 34 (1926)
- Blumenfaat, Anatomie und Klinik der Lumbosakralübergangswirbel, Erg. der Chir. u. Orth. 25 (1932)
- Burckhardt, Spondylolisthesis, Zbl. Chir. 1, (1930)
- Dittmar, Halbseitige Aufnahme des Lendenwirbel-Kreuzbeinabschnittes, Fortschr. Röntgenstr. 39 (1929)
- Fischer, Der letzte Lendenwirbel. Eine Röntgenstudie. Fortschr. Röntgenstr. 18 H. 5
- Glasewald, Gedanken und Bemerkungen über Spondylolisthesis und Praespondylolisthesis, Arch. f. Orth. 24 (1927)
- Hartung, Über Veränderungen im Lenden-Kreuzbeinwinkel, Bruns Beiträge 150, 1930
- Hartung, Technisches zur Röntgenaufnahme des Lendenkreuzbeinwinkels, Zbl. Chir. 8, 1931
- Hayek, Über Spondylolytis, Zbl. Gyn. 3, 1928
- Hellner, Spondylolisthesis, traumatische Sub- bzw. Totalluxation in der Lumbosakralregion und sogenannte Praespondylolisthesis, Fortschr. Röntgenstr. 41 (1930)

- Jaroschky*, Spondylolisthesis lumbosacralis, Bruns Beitr. 138 (1926)
- Josifsen*, Zur Kenntnis der Spondylolisthesis, Zbl. Chir. 1929
- Josifsen*, Über persistierende Apophysen an der Lendenwirbelsäule, Arch. f. Orth. 28 (1930)
- Junghanns*, Der Lumbosacralwinkel, Dtsch. Z. Chir. 213 (1929)
- Junghanns*, Die Spondylolisthese im Röntgenbild, Fortschr. Röntgenstr. 41 (1930)
- Junghanns*, Spondylolisthese, Bruns Beitr. 148 (1930)
- Junghanns*, Spondylolisthese, Praespondylolisthese und Wirbelverschiebung nach hinten, Bruns Beitr. 151 (1931)
- Junghanns*, Über Wirbelabgleiten, Arch. Chir. 159 (1930)
- Junghanns*, Die Zwischenwirbelscheiben im Röntgenbild, Fortschr. Röntg. 43, H. 3
- Klar*, Spondylolisthesis und Praespondylolisthesis, Verh. der dtsh. orthop. Gef. 1931
- Markelov*, Spondylolyse und Militärdienst, Ref. Z. org. f. Chir. 54 (1931)
- Lübke*, Das Kreuzbein und die Lumbosakralgegend, Arch. Chir. 163 (1931)
- Meyer-Burgdorff*, Untersuchungen über das Wirbelgleiten, Thieme, Leipzig, 1931
- Meyer-Burgdorff*, Untersuchungen zur Ätiologie des Wirbelgleitens, Bruns Beitr. 151 (1931)
- Meyer-Burgdorff*, Spondylolisthesis und Unfall, Arch. f. orth. Chir. 29 (1930)
- Michailovsky*, Beiträge zur Röntgendiagnose der Spondylolisthesis, Ref. Z. org. Chir. 48 (1930)
- Müller, Walter*, Röntgenologische Untersuchungen in der Lumbosacralgegend, Zbl. Chir. 57 (1930)
- Müller und Zwerg*, Röntgenologisch-metrische Untersuchungen über Form und Stellung des Kreuzbeins mit Beobachtungen über die Entstehung der Spondylolisthesis, Bruns Beitr. 149 (1930)
- Neugebauer*, Zur Entwicklungsgegeschichte des Spondylolisthetischen Beckens und seiner Diagnose, Dorpat 1881
- Novak*, Zwei Fälle von Spondylolisthesis, Zbl. Gyn. 1928
- Portmann*, Die Spondylolisthesis und ihre Behandlung, Z. org. Chir. 48, 1930
- Schaer*, Über Spondylolisthesis, Bruns B. 155
- Scherb*, Spondylolisthesis, Z. orth. Chir. 50 (1929)
- Schmorl*, Über die pathologische Anatomie der Wirbelbandscheiben, Bruns Beitr. 151 (1931)
- Schmorl*, Aussprache über Untersuchungen zur Ätiologie der Spondylolisthesis, Zbl. Chir. 42 (1930)
- Schmorl und Junghanns*, Die gesunde und kranke Wirbelsäule im Röntgenbild, Thieme 1932
- Schulz*, Zur Spondylolisthesis und Praespondylolisthesis Z. orth. Chir. 49 (1928)
- Sorge*, Der fünfte Lendenwirbel. Eine anatomisch-röntgenologische Studie. Arch. f. orthopäd. und Unfallchir. Bd. 32, 1933
- Turner*, Spondylolisthesis, ihr Wesen, klinische Erscheinungen und Bedeutung für die Veränderungen der Körperstatik, Z. org. Chir. 38 (1927)
- Warner*, Der fünfte Lendenwirbel, Arch. orth. Chir. Bd. 33, H. 2
- Warner*, Studien zur Pathologie des Lumbosacralgebietes, Hefte zur Unfallheilk. 1929
- Wegener*, Spondylolisthesis und Praespondylolisthesis, Arch. orth. Chir. 26 (1928)
- Weil*, Spondylolisthesis, Zbl. Chir. 54 (1927) und 57 (1930)
- Wilhelm*, Über Spondylolisthesis bzw. Praespondylolisthesis, Arch. orth. Chir. 24 (1927)
- Wolff*, Spondylolisthesis und Unfall, Z. orth. Chir. 61 (1934)

Lebenslauf:

Ich bin am 19. Juli 1910 als Sohn des Fährmeisters Johann Schöberl in München geboren. Nach 9jährigem Besuch des Humanistischen Gymnasiums in Passau legte ich hier im April 1930 die Reifeprüfung ab. Im Mai desselben Jahres begann ich das Medizinstudium an der Universität München und verblieb an der dortigen medizinischen Fakultät die vorklinischen und klinischen Semester. Im Herbst 1935 beendete ich mit dem medizinischen Staatsexamen mein Hochschulstudium an der Universität München.

Anschließend kam ich an der dortigen medizinischen Universitäts-poliklinik und nach Ablauf eines Vierteljahres am Städtischen Krankenhaus Passau den Bedingungen für meine ärztliche Approbation nach.